WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM



Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C07K 14/505, C12N 15/16, 15/85, 5/06, 5/08, 5/10, A61K 38/18

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/28346

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

10. Juni 1999 (10.06.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/07876

(22) Internationales Anmeldedatum: 3. Dezember 1998 (03.12.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 53 681.6 98113415.8

3. Dezember 1997 (03.12.97) DE 17. Juli 1998 (17.07.98)

EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE/DE]; Sandhofer Strasse 122-132, D-68305 Mannheim (DE).

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BURG, Josef [DE/DE]; An der Bärenmühle 1, D-82362 Weilheim (DE). SELLINGER, Karl-Heinz [DE/DE]; Trifthofstrasse 15, D-82362 Weilheim (DE). HASELBECK, Anton [DE/DE]; Bärenmühlweg 50, D-82362 Weilheim (DE). KOLL, Hans [DE/DE]; Adlerweg 2, D-82362 Weilheim (DE).
- (74) Anwälte: WEICKMANN, H. usw.; Kopernikusstrasse 9, D-81679 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: ERYTHROPOIETIN WITH HIGH SPECIFIC ACTIVITY
- (54) Bezeichnung: ERYTHROPOIETIN MIT HOHER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT
- (57) Abstract

The invention relates to new EPO compositions with a high specific activity, characterised by a high proportion of N-acetyl-lactosamin units and/or tetra-antenna branches in the carbon hydrate structure. The invention also relates to a method for preparing such EPO products.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft neue EPO-Zusammensetzungen mit hoher spezifischer Aktivität, die durch einen hohen Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten oder/und tetraantennären Verzweigungen in der Kohlenhydratstruktur gekennzeichnet sind. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Gewinnen solcher EPO-Produkte.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldan	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG ·	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China China	KR	Republik Korea	PT	Portuga!	•	
Cυ	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	rc	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Erythropoietin mit hoher spezifischer Aktivität

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft neue EPO-Zusammensetzungen mit hoher spezifischer Aktivität, die durch einen hohen Gehalt an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten oder/und tetraantennären Verzweigungen in der Kohlenhydratstruktur gekennzeichnet sind. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Gewinnen solcher EPO-Produkte.

10

Erythropoietin (EPO) ist ein humanes Glycoprotein, welches die Produktion von roten Blutzellen stimuliert. EPO kommt im Blutplasma von gesunden Personen nur in sehr geringen Konzentrationen vor, so daß eine Bereitstellung in größeren Mengen auf diese Weise nicht möglich ist.

15

EP-B1-O 148 605 und EP-B1-O 205 564 beschreiben die Herstellung von rekombinantem humanen EPO in CHO-Zellen. Das in EP-B1-O 148 605 beschriebene EPO weist ein höheres Molekulargewicht als urinäres EPO und keine O-Glykosilierung auf. Das in EP-B1-O 205 564 beschriebene EPO aus CHO-Zellen ist mittlerweile in großen Mengen und in reiner Form verfügbar.

20

Weiterhin ist die Gewinnung von humanem EPO aus dem Urin von Patienten mit aplastischer Anämie bekannt (Miyake et al., J. Biol. Chem. 252 (1977), 5558-5564).

25

30

Rekombinantes und urinäres EPO wird als Gemisch verschiedener Isoformen gewonnen, von denen bekannt ist, daß sie sich in ihrem Sialylierungsgrad unterscheiden. Diese EPO-Isoformen weisen unterschiedliche isoelektrische Punkte auf und können durch isoelektrische Fokussierung bzw. Kapillarelektrophorese aufgetrennt werden (siehe Tsao et al., Biotech. Bioeng. 40 (1992), 1190-1196; Nieto et al., Anal. Commun. 33 (1996), 425-427; Tran et al., J. Chromatogr. 542 (1991), 459-471; Bietot et al., J. Chromatogr.

10

15

20

25

30

759 (1997), 177-184; Watson et al. Anal. Biochem. 210 (1993), 389-393). Die Isoformen mit der höchsten Anzahl von Sialinsäuren weisen die höchste spezifische Aktivität auf, während die mit der niedrigsten Anzahl die geringste Aktivität besitzen (siehe z.B. Imai et al., Eur. J. Biochem. 194 (1990), 457-462; EP-A-O 428 267).

Takeuchi et al., (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86 (1989), 7819-7822) beschreiben einen Zusammenhang der biologischen Aktivität mit dem Sialinsäuregehalt und dem Verhältnis von bi- und tetraantennären Kohlenhydratstrukturen. Takeuchi et al. kommen weiterhin zur Schlußfolgerung, daß die in den EPO-Kohlenhydratstrukturen vorhandenen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten nicht mit der biologischen Aktivität korrelieren.

Fukuda et al. (Blood 73 (1989), 84-89) befassen sich mit der Geschwindigkeit der Elimination von EPO aus dem Blutkreislauf, die wesentlich zur biologischen Aktivität beiträgt, und kommen zu dem Schluß, daß EPO mit einer größeren Anzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten schneller aus dem Kreislauf entfernt wird als EPO ohne Lactosamin-Einheiten. Morimoto et al. (Glycoconjugate J. 13 (1996), 1093-1120) beschreiben die Auftrennung von EPO-Isoformen mittels Mono-Q-Chromatographie, so daß die einzelnen Fraktionen jeweils aus nur noch wenigen Isoformen bestehen. Die mit diesen Fraktionen durchgeführten Untersuchungen zeigen eine Gleichverteilung aller Strukturen in allen Fraktionen. Es wird keine Korrelation des Gehalts an bi- oder triantennären Strukturen oder des Gehalts an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten mit der spezifischen Aktivität gefunden.

Somit geht aus dem genannten Stand der Technik hervor, daß eine generelle Korrelation der biologischen Aktivität mit der Zuckerstruktur besteht, insbesondere im Hinblick auf den Gehalt an Sialinsäuren. Es findet sich jedoch keinerlei Hinweis, daß der Anteil an tetraantennären Strukturen oder/und der Anteil an N-Acetyl-Lactosamin eine direkte Korrelation mit der biologischen Aktivität besitzt.

10

15

20

25

30

Überraschenderweise wurde bei der Aufreinigung von EPO-Präparationen festgestellt, daß eine Erhöhung des Anteils an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in der Kohlenhydratstruktur zu einer signifikanten Verbesserung der spezifischen biologischen Aktivität führt. Dies trifft insbesondere zu bei der Herstellung von EPO in einer humanen Zellinie gemäß der europäischen Anmeldung 97 112 640.4.

Vergleichende Aktivitätsuntersuchungen einzelner EPO-Präparationen oder EPO-Isoformen, deren Kohlenhydratstruktur sich im wesentlichen nur im Gehalt der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (LE-Einheiten) unterscheidet, zeigen eine signifikant höhere Aktivität für die Präparationen oder Isoformen mit dem höheren Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bei gleichen Sialinsäuregehalt und bei etwa gleicher Antennärität. Unter Antennärität wird in diesem Zusammenhang der relative, mittlere Gehalt (in %) an bi-, tribzw. tetraantennären N-gebundenen Kohlenhydratketten der EPO-Präparationen bzw. der isolierten EPO-Isoformen bezüglich der Gesamtzahl N-gebundener Kohlenhydratketten verstanden. Außerdem wurde gefunden, daß gerade in Präparationen oder Isoformen mit einem erhöhten Anteil an triantennären Strukturen der Gesamtgehalt an Lactosamin-Einheiten, für die in vivo Aktivität von erheblicher Bedeutung ist. Durch eine Erhöhung des Gesamtgehalts an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten, z. B. in Form von zusätzlichen Verlängerungen der Core-Struktur mit LE-Einheiten (sog. Repeats), kann die biologische Aktivität erheblich gesteigert werden. Weiterhin wurde festgestellt, daß durch Erhöhung des Anteils an tetraantennären Strukturen eine Verbesserung der biologischen Aktivität erreicht werden kann.

Ist man folglich bestrebt, ein EPO-Präparat mit möglichst hoher spezifischer Aktivität und in hoher Ausbeute zu erzeugen, so ist bei der Auswahl der Aufreinigungsschritte, der Produktionszellen oder/und bei deren Kultivierung auf einen möglichst hohen Anteil von tetraantennären Kohlenhydrat-

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 4 -

strukturen oder/und einen möglichst hohen Gehalt an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu optimieren.

Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen Anteil von mindestens 75% vorzugsweise mindestens 80%, besonders bevorzugt mindestens 85% und am meisten bevorzugt mindestens 90% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten, d.h. die Summe von bi-, tri- und tetraantennären Strukturen, enthalten.

5

10

15

20

25

30

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die eine Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7, vorzugsweise von mindestens 4,0 besonders bevorzugt von mindestens 4,3 und am meisten bevorzugt von mindestens 4,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die mittlere Zusammensetzung pro N-gebundener Kohlenhydratkette des EPO-Moleküls bzw. eine Anzahl von mindestens 11,1, vorzugsweise von mindestens 12,0, besonders bevorzugt von mindestens 13,0 und am meisten bevorzugt von mindestens 13,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf alle 3 N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen (Gesamt-N-Glycosilierung) des EPO-Moleküls enthalten.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro EPO Molekül multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 130, vorzugsweise von mindestens 135, besonders bevorzugt von mindestens 140 und am meisten bevorzugt mindestens 160 aufweisen.

10

15

20

25

30

Die Angabe "im wesentlichen" bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die gewünschten EPO-Moleküle in einem Anteil von vorzugsweise mindestens 80%, besonders bevorzugt von mindestens 90% und am meisten bevorzugt von mindestens 95% bezogen auf die Gesamtzahl der EPO-Moleküle in der Zusammensetzung vorhanden sind.

Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen mittleren Anteil von mindestens 75%, vorzugsweise von mindestens 80% und besonders bevorzugt von mindestens 85% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten enthalten.

Außerdem betrifft die Erfindung eine EPO-Zusammensetzung, die aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die eine mittlere Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7, vorzugsweise von mindestens 4,0 und besonders bevorzugt von mindestens 4,3, und am meisten bevorzugt von mindestens 4,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die mittlere Zusammensetzung pro N-gebundener Kohlenhydratkette des EPO-Moleküls bzw. eine Anzahl von mindestens 11,1, vorzugsweise von mindestens 12,0, besonders bevorzugt von mindestens 13,0 und am meisten bevorzugt von mindestens 13,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf aile 3 N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen des EPO-Moleküls enthalten.

Die Höchstgrenze des Anteils an tetraantennären Strukturen kann bis zu 100% der gesamten Kohlenhydratketten reichen, wobei jede tetraantennäre Struktur 4 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in der core-Struktur des N-gebundenen Zuckers enthält. Zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten als sogenannte Repeats, die als Verlängerungen an der core-Struktur vorkommen, können die Zahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten sowohl pro Kohlenhydratstruktur, als auch in der Gesamtglycosilierung erhöhen. Die Anzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Glykosilierungsstelle (d.h. pro N-gebundener Kohlenhydratstruktur) kann somit bis zu 6 (tetraantennäre

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 6 -

Struktur und 2 zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in Form von Repeats) betragen (vgl. Fig. 1) oder - bei Strukturen mit mehr als 2 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten - sogar noch höher sein. Bezogen auf die Gesamtglykosilierung (3 N-gebundene Kohlenhydratstrukturen) kann die Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bis zu 18 oder höher betragen.

Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die aus glykosilierten Molekülen besteht, die einen mittleren Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten des EPO-Moleküls multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 130, vorzugsweise von mindestens 135 besonders bevorzugt von mindestens 140 und am meisten bevorzugt von mindestens 160 aufweisen.

15

20

25

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine EPO-Zusammensetzung, welche die Merkmale von mindestens zwei oder mehreren der zuvor genannten Aspekte aufweist.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann aus einer oder mehreren Isoformen, d.h. EPO-Molekülen mit unterschiedlichen isoelektrischen Punkten bei der isoelektrischen Fokussierung, bestehen. Vorzugsweise umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung ein Gemisch aus mindestens 2, z.B. aus 2 bis 5 Isoformen, insbesondere ein Gemisch aus oder 4 Isoformen.

Die spezifische Aktivität der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist vorzugsweise mindestens 175 000 IU/mg, insbesondere mindestens 200 000 IU/mg in vivo (normozythämische Maus). Besonders bevorzugt ist die spezifische Aktivität im Bereich von etwa 200 000 bis 400 000 IU/mg oder 450 000 IU/mg Protein, am meisten bevorzugt im Bereich von 250 000 bis 400 000 IU/mg oder 450 000 IU/mg Protein.

Der mittlere Sialinsäuregehalt bzw. die mittlere Anzahl der Sialinsäurereste pro Molekül EPO beträgt in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung vorzugsweise 11 bis 14, besonders bevorzugt mindestens 11,5 und am meisten bevorzugt mindestens 12,5.

5

10

15

20

25

30

Die erfindungsgemäße EPO-Zusammensetzung ist einerseits erhältlich aus EPO-Molekülen, die das Produkt einer Expression exogener DNA in Säugerzellen, z.B. in Nagetierzellen, wie etwa CHO- oder BHK-Zellen sind, wie sie in EP-B-0 205 564 beschrieben ist. Alternativ kann die Zusammensetzung auch aus EPO-Molekülen bestehen, welche das Produkt einer Expression endogener DNA nach Genaktivierung in humanen Zellen, z.B. in immortalisierten Zellinien wie etwa Namalwa (Nadkarni et al., Cancer 23 (1969), 64-79), HT1080 (Rasheed et al., Cancer 33 (1973), 1027-1033) oder HeLa S3 (Puck et al., J. Exp. Meth. 103 (1956), 273-284) sind. Derartige Verfahren sind in der europäischen Patentanmeldung 97 112 640.4 beschrieben, deren Offenbarung zum Bestandteil der vorliegenden Anmeldung gemacht wird.

Weitere wichtige Parameter für die biologische Aktivität von EPO sind der Anteil von Kohlenhydratketten mit Repeats, d.h. zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten, bezogen auf die Gesamtzahl von N-gebundenen Kohlenhydratketten sowie der Wert des Produkts dieses Repeat-Anteils mit dem Anteil von tetraantennären Kohlenhydratketten bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten. Bei EPO aus CHO-Zellen liegt der Repeat-Anteil vorzugsweise bei mindestens 30%, besonders bevorzugt bei mindestens 35% und am meisten bevorzugt bei mindestens 40%. Bei EPO aus humanen Zellen wie etwa HeLa-Zellen liegt der Repeat-Anteil bei vorzugsweise mindestens 10%, besonders bevorzugt bei mindestens 12% und am meisten bevorzugt bei mindestens 14%. Dementsprechend liegt bei EPO aus CHO-Zellen der Wert für das Produkt aus dem Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten und dem Anteil von tetraantennären

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten vorzugsweise bei mindestens 2400, besonders bevorzugt bei mindestens 2800 und am meisten bevorzugt bei mindestens 3400. Bei EPO aus humanen Zellen liegt der Wert vorzugsweise bei mindestens 800, besonders bevorzugt bei mindestens 960 und am meisten bevorzugt bei mindestens 1100.

5

10

15

20

25

30

Besonders bevorzugt wird eine EPO-Zusammensetzung verwendet, die durch Kultivierung von EPO-Produktionszellen in einem Kulturmedium mit geringem Serumgehalt, z.B. maximal 1% (v/v) oder insbesondere in einem serumfreien Kulturmedium hergestellt wurde (vgl. hierzu WO 96/35718). Beispiele für geeignete Kulturmedien sind RPMI 1640 oder DMEM.

Die erfindungsgemäße EPO-Zusammensetzung kann als pharmazeutisches Präparat gegebenenfalls zusammen mit üblichen pharmazeutischen Verdünnungs-, Hilfs- und Trägermitteln formuliert werden. Die erfindungsgemäße EPO-Zusammensetzung, die zur Herstellung eines pharmazeutischen Präparats eingesetzt werden kann, hat eine Reinheit von vorzugsweise mindestens 99% und besonders bevorzugt von mindestens 99,9% bei Bestimmung durch Reverse Phase-HPLC (z.B. auf einer Vydac C4-Säule) oder/und Größenausschlußchromatographie (z.B. auf einen TSK 2000SW Ultrapac-Säule).

Außerdem weist die erfindungsgemäße Zusammensetzung einen DNA-Gehalt von vorzugsweise < 10 pg, besonders bevorzugt < 5 pg und am meisten bevorzugt < 1 pg DNA pro 10 000 IU Protein auf. Außerdem ist die erfindungsgemäße Zusammensetzung vorzugsweise weitgehend frei von bakteriellen Verunreinigungen (< 1 CFU/ml) und Endotoxinen (< 1 EU/10 000 IU Protein).

Die Bestimmung des DNA-Gehalts kann durch einen Hybridisierungstest mit radioaktiver oder fluoreszenzmarkierter DNA erfolgen. Als Sonden-DNA wird

10

15

20

25

30

z.B. kommerziell erhältliche aufgereinigte Human-DNA verwendet. Die Human-DNA kann zudem als Standard für den Test eingesetzt werden. Die untere Nachweisgrenze eines solchen Hybridisierungstests beträgt etwa 0,3 pg/10 000 IU EPO. Der Keim- und Endotoxingehalt in der EPO-Präparation kann nach standardisierten Methoden bestimmt werden, wie sie in Pharm. Eu. oder USP beschrieben sind.

Eine EPO-Zusammensetzung, die vorzugsweise die erfindungsgemäß erwünschten Merkmale aufweist, ist erhältlich durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen:

- (a) Auswahl einer geeigneten Produktionszellinie, welche in der Lage ist, Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen,
- (b) Auswahl von geeigneten Kultivierungsbedingungen bei der Zellkultur, um Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Struktur oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen und
- (c) Abtrennung unerwünschter Bestandteile aus einer bekannten Zusammensetzung von EPO-Molekülen unter Anreicherung von EPO-Molekülen, die Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten enthalten.

Maßnahme (a) umfaßt die Auswahl einer geeigneten Produktionszelle. Einerseits kann man hier Zellen verwenden, von denen bekannt ist, daß sie eine Tendenz aufweisen, die gewünschten Kohlenhydratkettenstrukturen mit großer Ausbeute herzustellen. Beispiele für solche Zellinien sind vom Hamster abgeleitete Zellen wie CHO oder BHK und humane Zellinien wie HeLa, Namalwa, HT1080 oder davon abgeleitete Zellinien. Besonders bevorzugt sind HeLaS3-Zellen oder modifizierte CHO-Zellen.

Andererseits können geeignete Produktionszellen auch gezielt erzeugt werden, indem bestimmte Glykosilierungsenzyme in der Zelle überexprimiert

10

15

20

25

30

werden, z.B. durch rekombinante Expression oder/und durch endogene Genaktivierung. Beispiele solcher Glykosilierungsenzyme sind Sialyltransferasen, N-Acetyl-Glucosaminyltransferasen und Galactosyltransferasen.

Maßnahme (b) umfaßt die Auswahl geeigneter Kultivierungsbedingungen bei der Zellkultur. In einer ersten Ausführungsform der Erfindung umfaßt Maßnahme (b) die Zugabe einer Mischung von mindestens zwei und vorzugsweise mindestens drei Kohlenhydraten zum Kulturmedium. Die Kohlenhydrate werden vorzugsweise aus Mono- und Disacchariden wie etwa Glucose, Glucosamin, Ribose, Fructose, Galactose, Mannose, Saccharose, Lactose, Mannose-1-Phosphat, Mannose-1-Sulfat und Mannose-6-Sulfat ausgewählt. Beispielsweise sind Nährmedien geeignet, die Glucose oder/und Mannose oder/und Galactose enthalten. Besonders gute Ergebnisse wurden mit Nährmedien erzielt, die eine Mischung von Glucose, Galactose und Mannose, beispielsweise im Masseverhältnis von 1:(0,5-3):(1-5) und insbesondere von 1:(0,7-2,4):(1,8-4,0) enthalten, wobei die Kohlenhydrate jeweils besonders bevorzugt in der D(+)-Form eingesetzt werden. Die Gesamtkonzentration aller Zucker liegt während der Fermentation vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 bis 10 g/l, besonders bevorzugt in einem Bereich von 2 bis 6 g/l im Kulturmedium. Vorzugsweise erfolgt die Zugabe der Kohlenhydratmischung abhängig vom jeweiligen Bedarf der Zellen wie im folgenden weiter ausgeführt wird.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfaßt Maßnahme (b) die kontrollierte und vorzugsweise bedarfsgerechte Zugabe von Nährstoffen, umfassend mindestens eine für die kultivierte Zellinie essentielle Aminosäure oder/und mindestens ein Kohlenhydrat, abhängig vom jeweiligen Bedarf der Zellen. Auf diese Weise wird selbst bei einer Hochzelldichtefermentation (Zelldichte bei der Ernte > 10 x 10⁵ Zellen/ml und vorzugsweise > 20 x 10⁵ Zellen/ml) in Großfermentern (Volumen > 1 l, z.B. 50 - 10.000 l) eine deutlich verbesserte Glykosilierung erhalten. Hierzu wird kontinuierlich oder in geeigneten Zeitintervallen, z.B. mindestens einmal täglich, die

10

15

20

Konzentration von Parametern bestimmt, die in Korrelation zum Nährstoffbedarf der Zellen stehen und deren Verbrauchsraten ermittelt. Auf diese Weise können die für den Bedarf der Zellen benötigten Nährstoffe quantitativ oder/und qualitativ ermittelt werden. Solche Parameter können Nährstoffe oder Stoffwechselprodukte der Zellen sein, wie etwa die Glutamin-, die Ammonium-, die Glucose- oder/und die Lactatkonzentration, insbesondere die Glutamin-Konzentration.

Die gemäß diesem Aspekt der Erfindung zugegebenen Nährstoffe umfassen essentielle Aminosäuren, z.B. Glutamin oder/und Tryptophan, oder/und Kohlenhydrate, sowie vorzugsweise weiterhin nichtessentielle Aminosäuren, Vitamine, Spurenelemente, Salze oder/und Wachstumsfaktoren, z.B. Insulin. Besonders bevorzugt umfassen die Nährstoffe mindestens eine essentielle Aminosäure und mindestens ein Kohlenhydrat. Diese Nährstoffe werden vorzugsweise in gelöstem Zustand dem Kulturmedium zudosiert. Die Nährstofflösungen enthalten vorzugsweise zumindest Glutamin und Kohlenhydrate, insbesondere eine Mischung aus mindestens 2 Kohlenhydraten wie zuvor genannt. Besonders bevorzugt wird eine Mischung von Glucose, Galactose und Mannose eingesetzt. Weiterhin ist bevorzugt, daß die Zugabe der Nährstoffe über die gesamte Wachstumsphase der Zellen bedarfsgerecht, d.h. abhängig von der im Kulturmedium gemessenen Konzentration der ausgewählten Parameter erfolgt.

Das Mengenverhältnis von Glutamin zu Kohlenhydraten in der Nährstofflösung wird vorzugsweise so gewählt, daß es dem Verbrauchsverhältnis im Fermenter im wesentlichen entspricht. Auf diese Weise kann eine weitgehend gleichbleibende Konzentration einzelner Substrate im Fermenter erreicht werden. Vorzugsweise wird die Konzentration von Glutamin auf einem Wert gehalten, der < 150 mg/l im Kulturmedium ist und die Entstehung einer Ammoniumkonzentration ≥ 2,3 mmol/l im Kulturmedium verhindert. Die Gesamtkonzentration der Zucker liegt während der

20

25

30

Fermentation - wie bereits ausgeführt - vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 bis 10 g/l, besonders bevorzugt in einem Bereich von 2 bis 6 g/l Kulturmedium.

Die verwendete Nährstofflösung enthält ein Masseverhältnis von Glutamin zu Zuckern, das vorzugsweise im Bereich von 1:3 bis 20 und besonders bevorzugt von 1:5 bis 15, bezogen auf die gesamten Zucker, liegt. Bei Verwendung einer Nährstofflösung, die Glutamin sowie die drei Zucker Glucose, Galactose und Mannose enthält, liegt das Masseverhältnis von Glutamin zu den Zuckern vorzugsweise bei 1:(1 bis 3):(1 bis 5):(2 bis 8) und besonders bevorzugt bei 1:(1,5 bis 2,2):(1,5 bis 3,6):(4 bis 6).

Die Kultivierung wird vorzugsweise als wiederholt satzweiser Betrieb durchgeführt, wobei nach einer Wachstumsphase ein Teil der Kulturbrühe geerntet wird und der Rest der Kulturbrühe im Fermenter bleibt, der anschließend wieder bis zum Arbeitsvolumen mit frischem Medium befüllt wird. Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann glykosiliertes EPO in sehr hohen Ausbeuten geerntet werden. So beträgt die Konzentration zum Erntezeitpunkt beispielsweise mindestens 30 mg und insbesondere mindestens 40 mg EPO pro I Kulturmedium.

Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren zur Gewinnung von EPO aus eukaryontischen Zellen, wobei die eukaryontischen Zellen in einem geeigneten Medium kultiviert und das EPO aus dem Kulturüberstand gewonnen wird, wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, daß die Kultivierung bei einer Temperatur von ≤ 36°C, vorzugsweise zwischen 30 und 35,5°C und besonders bevorzugt zwischen 33 und 35,0°C erfolgt. Überraschenderweise wurde nämlich festgestellt, daß durch Temperatursenkung bei der Kultivierung der Anteil an EPO mit gewünschter Glykosilierung deutlich erhöht wird.

10

25

Maßnahme (c) umfaßt die Abtrennung unerwünschter Bestandteile aus einer bekannten EPO-Zusammensetzung, die in ihrer Kohlenhydratstruktur die Spezifikationen der vorliegenden Anmeldung nicht erfüllt. Dies kann beispielsweise erfolgen durch chromatographische Aufreinigung der EPO-Präparationen, z.B. durch Affinitätschromatographie an Triazinfarbstoff-Gelen, vorzugsweise Cibacron Blue-Farbstoffgelen. Eine weitere Abtrennung unerwünschter Bestandteile kann auch mit hydrophober Interaktionschromatographie und Reversed Phase Chromatographie durchgeführt werden. Dafür geeignete Liganden sind Butyl-, Pentyl-, Octyl-, Octadecyl- und Phenyl-Reste. Der Reversed Phase-Chromatographie-Schritt wird vorzugsweise bei einem pH-Wert im Bereich von 6,0 bis 8,5 und besonders bevorzugt von 7,0 bis 8,0 durchgeführt. Geeignete Eluenten sind beispielsweise Acetonitril, Ethanol oder Isopropanol, vorzugsweise Acetonitril.

Mit Kapillarzonenelektrophorese-Analytik (CZE) können geeignete Fraktionen ermittelt, gepoolt und schließlich weiterverarbeitet werden. Außerdem kann unter Verwendung von Lectinen aus Tomaten oder Kartoffeln (Merkle, Cummings, J. Biol. Chem. 262 (1987), 8179-8189) eine direkte Anreicherung von EPO-Molekülen mit einem hohen Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten erfolgen. Bevorzugt werden solche Lectine z.B. in immobilisierter Form eingesetzt.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Erhöhung der spezifischen Aktivität einer EPO-Zusammensetzung, wobei man EPO-Moleküle in der Zusammensetzung anreichert, die

- (a) einen hohen Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen,
- (b) eine große Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten,
- (c) einen hohen Wert des Produkts aus der Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten und dem Sialinsäuregehalt,
- 30 (d) einen hohen Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats oder/und

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 14 -

(e) einen hohen Wert des Produkts aus dem Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats und dem Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen aufweisen.

Diese Anreicherung kann durch eine oder mehrere der oben genannten Maßnahmen (a), (b) und (c) erfolgen.

Weiterhin wird die vorliegende Erfindung durch die nachfolgenden Figuren und Beispiele erläutert.

10

15

Es zeigen:

Figur 1: die Darstellung einer tetraantennären Kohlenhydratstruktur mit zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats) und Sialinsäuren,

Figur 2:

den relativen Anteil einzelner EPO-Isoformen in Abhängigkeit von den dem Kulturmedium zugesetzten Kohlenhydraten,

Figur 3:

die biologische Aktivität von EPO-Präparaten in Abhängigkeit von den dem Kulturmedium zugesetzten Kohlenhydraten und

20 Figur 4:

die biologische Aktivität von EPO-Isoformen in Abhängigkeit vom Anteil der N-Acetyl-Lactosamin-Repeat-Einheiten.

Beispiel 1 Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen von Zellinien

Im wesentlichen wurden zur Aufreinigung von EPO aus Zellkulturüberständen von humanen Zellen oder CHO-Zellen zwei Methoden verwendet, die sich in Anzahl und Prinzip der Chromatographieschritte unterschieden und abhängig von der Zusammensetzung des Mediums und der EPO-Konzentration eingesetzt wurden:

30

Methode 1: 1. Schritt: Blue-Sepharose-Säule

2. Schritt: Butyl-Sepharose-Säule

10

. 25

3. Schritt: Hydroxyapatit-Säule

4. Schritt: Aufkonzentrierung

Methode 2: 1. Schritt: Blue-Sepharose-Säule

2. Schritt: Hydroxyapatit-Säule

3. Schritt: Aufkonzentrierung

(alternativer 3. Schritt: RP-HPLC)

Beispiel für eine Aufreinigung eines Hela S3-Zellkulturüberstandes mit 2 % (v/v) fötalem Kälberserum (FKS) nach Methode 1:

1. Blue Sepharose-Säule:

Eine 5 ml Hi-Trap-Blue-Säule (Blue-Sepharose-Fertigsäule von Pharmacia) wurde mit mindestens 5 Säulenvolumina (SV) Puffer A (20 mM Tris-HCl, pH, 7,0; 5 mM $CaCl_2$; 100 mM NaCl) äquilibriert. Anschließend wurden 70 ml Hela-Zellüberstand (ca. 245 μ g EPO und 70-100 mg Gesamtprotein enthaltend) über Nacht bei einem Fluß von 0,5 ml/min im Kreislaufverfahren aufgezogen.

Die Säule wurde mit mindestens 5 SV Puffer B (20mM Tris-HCl, pH 7,0; 5 mM CaCl₂; 250 mM NaCl) und mindestens 5 SV Puffer C (20mM Tris-HCl, pH 7,0; 0,2 mM CaCl₂, 250 mM NaCl) bei 0,5 ml/min gewaschen. Der Wascherfolg wurde über die Messung des Proteingehalts bei OD280 verfolgt.

Die Elution von EPO erfolgte mit Puffer D (100 mM Tris-HCl, pH 7,0; 0,2 mM CaCl₂; 2 M NaCl) bei einem Fluß von 0,5 ml/min. Die Elutionslösung wurde in 1-2 ml Fraktionen gesammelt.

Der EPO-Gehalt der Fraktionen, der Waschlösungen und des Durchlaufs wurden über Reverse-Phase (RP)-HPLC durch Auftrag eines Aliquots auf eine POROS R2/H-Säule (Boehringer Mannheim) bestimmt. Alternativ wurde

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 16 -

zur qualitativen Identifizierung EPO-haltiger Fraktionen ein immunologischer Dotblot durchgeführt.

EPO-haltige Fraktionen der Elution (8-12 ml) wurden gepoolt und auf eine Butyl-Sepharose-Säule aufgetragen.

Die Ausbeute nach der Blue-Sepharose-Säule betrug ca. 175 μ g EPO (entspricht ca. 70%). Im Allgemeinen betrug die Ausbeute nach Blue-Sepharose zwischen 50-75%.

2. Butyl-Sepharose-Säule (Hydrophobe-Interaktions-Chromatographie)

10

15

25

30

Eine selbsthergestellte 2-3 ml Butyl-Sepharose-Säule (Material: Toyopearl Butyl S650) wurde mit mindestens 5 SV Puffer D (100 mM Tris-HCl, pH 7,0; 0,2 mM CaCl₂; 2 M NaCl) äquilibriert und anschließend der EPO-haltige Blue-Sepharose-Pool aus 1. (ca. 150 μ g EPO) bei einem Fluß von 0,5 ml/min aufgezogen.

Die Säule wurde mit mindestens 5 SV Puffer E (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl und 10 % Isopropanol) bei 0,5 ml/min gewaschen. Der Wascherfolg wurde über die Messung des Proteingehalts bei OD280 verfolgt.

Die Elution von EPO erfolgte mit Puffer F (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl und 20 % Isopropanol) bei Raumtemperatur und einem Fluß von 0,5 ml/min. Die Elutionslösung wurde in 1-2 ml Fraktionen gesammelt.

Der EPO-Gehalt der Fraktionen, der Waschlösungen und des Durchlaufs wurden über RP-HPLC durch Auftrag eines Aliquots auf eine POROS R2/H-Säule bestimmt. Alternativ wurde zur qualitativen Identifizierung EPO-haltiger Fraktionen ein immunologischer Dotblot durchgeführt.

EPO-haltige Fraktionen der Elution (10-15 ml) wurden gepoolt und auf eine Hydroxy-apatit-Säule aufgetragen.

Die Ausbeute der Butyl-Sepharose-Säule betrug ca. 130 µg EPO (entspricht ca. 85 %). Im Allgemeinen betrug die Ausbeute der Butyl-Sepharose zwischen 60-85% vom Auftrag der Blue-Sepharose-Pools.

3. Hydroxyapatit-Säule

Eine 5 ml Hydroxyapatit-Säule (Econo-Pac CHT II-Fertigsäule von BioRAD) wurde mit mindestens 5 SV Puffer F (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl; 20% Isopropanol) äquilibriert und anschließend der EPO-haltige Butyl-Sepharose-Pool aus 2. (ca. 125 μg EPO) bei einem Fluß von 0,5 ml/min aufgezogen.

15

30

Die Säule wurde mit mindestens 5 SV Puffer G (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl) bei 0,5 ml/min gewaschen. Der Wascherfolg wurde über die Messung des Proteingehalts bei OD280 verfolgt.

Die Elution von EPO erfolgte mit Puffer H (10 mM Na-Phosphat, pH 7,0; 80 mM NaCl) bei einem Fluß von 0,5 ml/min. Die Elutionslösung wurde in 1-2 ml Fraktionen gesammelt.

Der EPO-Gehalt der Fraktionen, der Waschlösungen und des Durchlaufs wurden über RP-HPLC durch Auftrag eines Aliquots auf eine POROS R2/H-Säule bestimmt.

EPO-haltige Fraktionen der Elution (3-6 ml) wurden gepoolt. Die Ausbeute der Hydroxyapatit-Säule betrug ca. 80 µg EPO (entspricht ca. 60%). Im Allgemeinen betrug die Ausbeute der Hydroxyapatit-Säule zwischen 50-65% vom Auftrag der Butyl-Sepharose-Pools.

4. Aufkonzentrierung

Die gepoolten EPO-Fraktionen aus dem Hydroxyapatit-Schritt wurden in Zentrifugationseinheiten mit einer Ausschlußgröße von 10 kD (z.B. Microsep von Filtron) auf eine Konzentration von 0,1-0,5 mg/ml aufkonzentriert, mit 0,01% Tween 20 versetzt und in Aliquots bei -20°C gelagert.

Ausbeuteschema:

1	O	

5

	EPO (µg)	Ausbeute (%)
Ausgang	245	100
Blue-Sepharose	175	70
Butyl-Sepharose-Säule	130	53
Hydroxyapatit-Säule	80	33
Aufkonzentrierung	60	25

15

Die Reinheit des isolierten EPO war etwa > 90%, in der Regel sogar > 95%.

20

25

Zur Erhöhung der EPO-Ausbeute wurde auch die Methode 2 verwendet, bei der der Butyl-Sepharose-Schritt fehlte. Vor allem bei Zellkulturüberständen ohne oder mit 1% (v/v) FKS-Zusatz ist diese Methode anwendbar und liefert isoliertes EPO von ungefähr gleicher Reinheit (90-95%). Die Anwesenheit von 5 mM CaCl₂ im Äquilibrierungspuffer (Puffer F) für die Hydroxyapatit-Säule führte bei dieser Methode zu einer verbesserten Bindung und damit auch zu einem verbessert reproduzierbaren Elutionsverhalten von EPO beim Hydroxyapatit-Schritt. Deshalb wurde bei Methode 2 bei prinzipiell gleichem Ablauf wie Methode 1 mit folgenden Puffern durchgeführt:

1. Blue-Sepharose-Säule:

30 Äquilibrierpuffer (Puffer A):

20 mM Tris-HCl, pH 7,0;

5 mM CaCl₂; 100 mM NaCl

PCT/EP98/07876

WO 99/28346

- 19 -

Waschpuffer 1 (Puffer B):

20 mM Tris-HCl, pH 7,0;

5 mM CaCl₂; 250 mM NaCl

Waschpuffer 2 (Puffer C):

20 mM Tris-HCl, pH 7,0;

5 mM CaCl₂, 250 mM NaCl

5 Elutionspuffer (Puffer D):

100 mM Tris-HCl, pH 7,0;

5 mM CaCl₂; 2 M NaCl

2. Hydroxyapatit-Säule

Äquilibrierpuffer (Puffer F):

50 mM Tris-HCl, pH 7,0;

5 mM CaCl₂; 1 M NaCl

Waschpuffer (Puffer G):

10 mM Tris-HCl, pH 7,0;

5 mM CaCl₂; 80 mM NaCl

Elutionspuffer (Puffer H):

10 mM Na-Phosphat, pH 7,0;

0,5 mM CaCl₂; 80 mM NaCl

15

10

Ausbeuteschema:

	EPO (µg)	Ausbeute (%)
Ausgang	600	100
Blue-Sepharose	450	75
Hydroxyapatit-Säule	335	55
Aufkonżentrierung	310	52

20

25

30

Der Zusatz von 5 mM CaCl₂ in die Puffer C bis G bei Methode 1 führte ebenfalls zu einer besseren Bindung und definierteren Elution von der Hydroxyapatit-Säule.

Alternativ bzw. zusätzlich können für die Aufreinigung von EPO noch folgende Schritte verwendet werden:

- RP-HPLC z.B. mit Vydac C4-Material
- DEAE-Sepharose ff Chromatographie
 - Diafiltration

10

20

25

Beispiel 2: Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen unter Erhalt der Isoformen 1 - 8 (Vergleich)

1. Ausgangsmaterial

EPO aus Säugerzellen, z.B. CHO- oder humanen Zellen, wurde nach einem Repeated-Batch-Verfahren fermentiert. Ein 1000 i Fermenter wurde mit einer Vorkultur angeimpft und nach ca. 3 bis 5 Tagen der Fermenterinhalt geerntet. Nach der Ernte wurden die Zellen aus der Fermentationsbrühe durch Abzentrifugieren entfernt. Der zellfreie Kulturüberstand wird mit 1 mol/l Essigsäure auf pH 5.0 - 5.2 eingestellt und bei 1 - 9 °C filtriert.

2. Blue-Sepharose-Chromatographie

Eine Chromatographiesäule (Amicon P440 x 500, Amicon, GB) wurde mit 60 - 80 l Blue Sepharose gefüllt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 Säulenvolumina (SV) Acetatpuffer äquilibriert.

Der zellfreie, auf pH 5 eingestellte Kulturüberstand wurde bei einer Temperatur von 10 ± 5 °C und einer Flußrate von 800 - 1400 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Flußrate und 5 ± 4 °C mit ca. 1 SV Waschpuffer 1 nachgewaschen. Dann folgten ca. 2 SV Waschpuffer 2. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde gesammelt (ca. 30 - 60 l), mit HCl auf pH 6.9 eingestellt und bis zur Weiterverarbeitung bei 5 ± 4 °C gelagert. Bei diesem Chromatograhieschritt wurde die Produktlösung konzentriert und eine Reinheit von ca. 40 - 50 % erreicht.

30 Äquilibrierpuffer: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl $_2$, 0,1 M NaCl, pH 5.0 \pm 0.2

10

15

20

Waschpuffer 1: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl₂, 0,25 M NaCl,

 $pH 5.0 \pm 0.2$

Waschpuffer 2: 20 mM Tris HCl, 5 mM CaCl₂, pH 6.5 \pm 0.3

Elutionspuffer: 100 mM Tris HCl, 5 mM CaCl₂, 1 M NaCl, pH 9.0 \pm 0.2

3. Butyl-Toyopearl-Chromatographie (Hydrophobe Chromatographie)

Eine Chromatographiesäule (Pharmacia BPG 300/500) wurde mit 30 - 40 I Butyl-Toyopearl gefüllt und mit 4 M Guanidin-HCI und 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 3 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

Das Eluat der Blue Sepharose-Säule wurde auf 10 % Isopropanol eingestellt und bei einer Temperatur von 27 ± 2 °C und einer Flußrate von 800 - 1200 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquilibrierpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wird gesammelt (ca. 10 - 18 l), sofort mit Verdünnungspuffer um den Faktor 3 verdünnt und bis zur Weiterverarbeitung bei 15°C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurde eine Reinheit von ca. 90 % erreicht.

Äquilibrierpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0,75 M NaCl,

10 % Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

25 Waschpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl2, 0,75 M NaCl,

19 % Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

Elutionspuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0,75 M NaCl,

27 % Isopropanol, pH 6.9 \pm 0.2

Verdünnungspuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM $CaCl_2$, pH 6.9 \pm 0.2

10

15

4. Hydroxyapatit Ultrogel-Chromatographie

Eine Chromatographiesäule (Amicon P440 x 500 oder Äquivalent) wurde mit 30 - 40 l Hydroxyapatit Ultrogel gepackt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 4 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

Das Eluat der Butyl-Toyopearl Säule wurde bei einer Temperatur von ca. 15°C und einer Flußrate von 500 - 1200 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquilibrierpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde gesammelt (ca. 10 - 18 l) und bis zur Weiterverarbeitung bei 15°C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurde eine Reinheit von mehr als 95 % erreicht.

Äquilibrierpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0,25 M NaCl, 9 % Isopro-

panol, pH 6.9 ± 0.2

Waschpuffer: 10 mM Tr

10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 6.8 \pm 0.2

20 Elutionspuffer:

10 mM Tris-HCl, 10 mM K-Phosphat, 0,5 mM CaCl₂,

 $pH 6.8 \pm 0.2$

5. Reversed Phase HPLC (RP-HPLC)

Eine präparative HPLC wurde mit einer Merck Prepbar 100-Trennanlage (oder Äquivalent) bei einer Temperatur von 22 ± 4 °C durchgeführt. Die Trennsäule (100 mm x 400 mm, 3,2 l) war mit Vydac C4-Material gepackt. Vor dem Einsatz wurde die Säule durch mehrfaches Anlegen eines Gradienten von Puffer A nach 100 % Lösungsmittel regeneriert und anschließend mit Puffer A äquilibriert.

10

15

Das Eluat der Hydroxyapatit-Säule wurde mit Trifluoressigsäure auf ca. pH 2.5 angesäuert und sterilfiltriert. Anschließend wurde es bei einer Temperatur von 22 ± 4 °C und einer Flußrate von 250 - 310 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit einem linearen Gradient von Puffer A nach Puffer B eluiert. Der Elutionspeak wurde in Fraktionen aufgefangen. Durch Vorlegen von 4 Volumina HPLC-Verdünnungspuffer wurde das Eluat sofort neutralisiert.

Fraktionen, die bei der analytischen HPLC eine Reinheit von mindestens 99 % aufweisen, wurden vereinigt (Poolvolumen ca. 4 - 6 l). Bei dieser Chromatographie wurden Spurenverunreinigungen abgetrennt und eine Reinheit von besser 99 % erreicht.

Puffer A:

0,1 % Trifluoressigsäure in Wasser

Puffer B:

80 % Acetonitril, 0,1 % Trifluoressigsäure in Wasser

HPLC-Verdünnungspuffer:

10 mM Na/K-Phosphat, pH 7.5 \pm 0.2

6. DEAE-Sepharose ff Chromatographie

Eine Chromatographiesäule (Amicon P90 x 250 oder Äquivalent) wurde mit 100 - 200 ml Gel pro g EPO im Auftrag gefüllt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule zunächst mit 100 mM Na/K-Phosphatpuffer, pH 7.5 und dann mit mindestens 12 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

25

30

20

Das Eluat der HPLC-Säule wurde bei einer Temperatur von 5 ± 4 °C und einer Flußrate von ca. 150 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit mindestens 5 SV Äquilibrierpuffer und dann mit ca. 10 SV Waschpuffer gewaschen. Anschließend wurde sie erneut mit ca. 10 SV Äquilibrierpuffer gewaschen und dann mit ca. 7 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde gesammelt (ca. 2 - 5 l), sterilfiltriert und abgefüllt.

Bei dieser Chromatographie wurde das Lösungsmittel aus dem HPLC-Schritt abgetrennt und Spurenverunreinigungen entfernt. Die Reinheit ist besser 99%.

5 Äquilibrierpuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, pH 7.5 \pm 0.2

Waschpuffer: 30 mM Na-Acetat, pH 4.5 \pm 0.1

Elutionspuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, 80 mM NaCl pH 7.5 \pm 0.2

Beispiel 3: Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen unter Erhalt der Isoformen 1 - 4 (Erfindung)

1. Ausgangsmaterial

EPO aus Säugerzellen, z.B. CHO- oder humanen Zellen, wurde nach dem Repeated-Batch-Verfahren fermentiert. Ein 10 I Fermenter wurde mit einer Vorkultur angeimpft und nach ca. 5 Tagen der Fermenterinhalt geerntet. Nach der Ernte wurden die Zellen aus der Fermentationsbrühe durch Abzentrifugieren entfernt. Der zellfreie Kulturüberstand wurde mit 1 mol/l Essigsäure auf pH 5.0 - 5.2 eingestellt und bei 1 - 9 °C filtriert.

20

25

30

10

15

2. Blue-Sepharose-Chromatographie

Eine geeignete Chromatographiesäule wurde mit 150 - 250 ml Blue-Sepharose gefüllt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 Säulenvolumina (SV) Acetatpuffer äquilibriert.

Der zellfreie, auf pH 5 eingestellte Kulturüberstand wurde bei einer Temperatur von 10 \pm 5 °C und einer Flußrate von 1 - 2 SV/h auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Flußrate und 5 \pm 4 °C mit ca. 1 SV Waschpuffer 1 nachgewaschen. Dann folgten ca. 2 SV Waschpuffer 2. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 - 6 SV Elutionspuffer eluiert. Der Proteinpeak wurde fraktioniert gesammelt. Nach CE-Analytik wurden

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 25 -

geeignete Fraktionen gepoolt, mit HCl auf pH 6.9 eingestellt und bis zur Weiterverarbeitung bei 5 \pm 4 °C gelagert. Bei diesem Chromatograhieschritt wurde die Produktlösung konzentriert und Verunreinigungen, sowie basische Isoformen abgetrennt.

5

Äquilibrierpuffer: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl₂, 0,1 M NaCl, pH 5.0 ±

0.2

Waschpuffer 1: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl₂, 0,25 M NaCl, pH 5.0

 ± 0.2

Waschpuffer 2: 20 mM Tris HCl, 5 mM CaCl₂, pH 6.5 \pm 0.3

Elutionspuffer: 50 mM Tris HCl, 5 mM CaCl₂, 0,25 M NaCl, pH 8.0 ±

0.2

3. Butyl-Toyopearl-Chromatographie (hydrophobe Chromatographie)

15

Eine geeignete Chromatographiesäule wurde mit 200 - 300 ml Butyl-Toyopearl gefüllt und mit 4 M Guanidin-HCl und 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 3 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

20

25

30

Das Eluat der Blue Sepharose-Säule wurde auf 10 % Isopropanol eingestellt und bei einer Temperatur von 27 ± 2 °C und einer Flußrate von 1 - 2 SV/h auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquilibrierpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 5 - 10 SV Elutionspuffer eluiert. Von dem Proteinpeak wurden Fraktionen gesammelt und sofort mit Verdünnungspuffer um den Faktor 3 verdünnt. Nach CE-Analytik wurden geeignete Fraktionen gepoolt und bis zur Weiterverarbeitung bei 15 °C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurden weitere basische Isoformen abgetrennt und eine Reinheit von > 80 % erreicht.

Äquilibrierpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl, 0,2 M NaCl, 10 %

Isopropanol, pH 6.9 \pm 0.2

Waschpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0,2 M NaCl, 17 %

Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

5 Elutionspuffer:

20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl, 0,2 M NaCl,

23 % Isopropanol, pH 6.9 \pm 0.2

Verdünnungspuffer:

20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 6.9 ± 0.2

4. Hydroxyapatit Ultrogel-Chromatographie

10

Eine geeignete Chromatographiesäule wurde mit 150 - 200 ml Hydroxyapatit Ultrogel gepackt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 4 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

Das Eluat der Butyl-Toyopearl Säule wurde bei einer Temperatur von ca. 15°C und einer Flußrate von 1 - 2 SV/h auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquilibrierpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde gesammelt und bis zur Weiterverarbeitung bei 15°C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurde eine Reinheit von besser 95 % erreicht.

Äquilibrierpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0,06 M NaCl, 7,5 %

Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

25 Waschpuffer:

10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 6.8 \pm 0.2

Elutionspuffer:

10 mM Tris-HCl, 10 mM K-Phosphat, 0,5 mM CaCl₂,

 $pH 6.8 \pm 0.2$

5. Reversed Phase HPLC (RP-HPLC)

30

Eine semipräparative HPLC wurde mit einer Vydac C4 - Trennsäule (20 mm \times 250 mm, ca. 80 ml) bei einer Temperatur von 22 \pm 4 °C durchgeführt.

Vor dem Einsatz wurde die Säule durch mehrfaches Anlegen eines Gradienten von Puffer A nach 100 % Lösungsmittel regeneriert und anschließend mit Puffer A äquilibriert.

Das Eluat der Hydroxyapatit-Säule wurde bei einer Temperatur von 22 ± 4°C und einer Flußrate von 8 - 15 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit einem linearen Gradienten von Puffer A nach Puffer B gemäß folgendem HPLC-Protokoll eluiert. Der Elutionspeak wurde in Fraktionen aufgefangen. Durch Vorlegen von 4 Volumina HPLC-Verdünnungspuffer wurde das Eluat sofort verdünnt.

HPLC-Protokoll:

15

20

25

Zeit (min)	Schritt	% Puffer A (v/v)	% Puffer B (v/v)	
	Start	·		
0,0		100	0	
	Wasch 1			
10,0		100	0	
	Wasch 2			
20,0		50	50	
	Wasch 3 und Elution (*)			
160,0		0	100	
	Nachwasch			
170,0		О	100	
	Zurückstellen au	uf Ausgangsbedingu	ngen	
171,0		100	0	

- (*) Wasch 3 und Elutionsbedingungen: Gradient von 50% Puffer B nach 100% Puffer B in 50 bis 200 min, bevorzugt 140 min.
- Fraktionen, die bei der analytischen HPLC eine Reinheit von mindestens 99% aufweisen und nach CE-Analytik geeignet sind, wurden vereinigt. Bei

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 28 -

dieser Chromatographie wurden Spurenverunreinigungen sowie Reste basischer Isoformen abgetrennt und eine Reinheit von besser 99 % erreicht.

Puffer A:

10 mM Na/K-Phosphat, pH 7.0 \pm 0.2

Puffer B:

10 mM Na/K-Phosphat, 80 % Acetonitril, pH 7.0

 ± 0.2

HPLC-Verdünnungspuffer:

10 mM Na/K-Phosphat, 100 mM NaCl,

 $pH 7.5 \pm 0.2$

10 6. Diafiltration

Eine Diafiltrationsapparatur geeigneter Größe wurde mit einer 10 kD Kassette bestückt und mit 1 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Apparatur mit Bulkpuffer laugefrei gespült.

15

Das Eluat der HPLC-Säule wurde bei einer Temperatur von 5 ± 4 °C konzentriert und gegen 10 Volumina an Bulkpuffer diafiltriert. Die Endkonzentration sollte zwischen 1 - 3 mg/ml betragen.

Dieser Schritt dient zur Entfernung von Lösungsmittelresten aus dem HPLC-Schritt, zur Einstellung der erforderlichen Bulkpufferbedingungen und Produktkonzentration des Bulk-Wirkstoffs.

Bulkpuffer:

10 mM Na/K-Phosphat, 100 mM NaCl, pH 7.5 \pm 0.2

15

20

25

Beispiel 4 Bestimmung der spezifischen Aktivität von EPO in vivo (Bioassay an der normozythämischen Maus)

Die dosisabhängige Aktivität von EPO auf die Vermehrung und Differenzierung von Erythrozyten-Vorläuferzellen wurde in vivo in Mäusen über den Anstieg der Reticulocyten im Blut nach EPO-Gabe bestimmt.

Hierzu wurden jeweils acht Mäusen verschiedene Dosen der zu analysierenden EPO-Probe und eines EPO-Standards (abgeglichen gegen den EPO-WHO-Standard) parenteral verabreicht. Die Mäuse wurden anschließend unter konstanten definierten Bedingungen gehalten. 4 Tage nach EPO-Gabe wurde den Mäusen Blut entnommen und die Reticulocyten mit Acridinorange angefärbt. Die Bestimmung der Reticulocytenzahl pro 30 000 Erythrocyten erfolgte mikrofluorimetrisch im Durchflußcytometer durch Analyse des Rotfluoreszenz-Histogramms.

Die Berechnung der biologischen Aktivität erfolgte aus den Werten für die Reticulocytenzahlen der Probe und des Standards bei unterschiedlichen Dosen nach dem von Linder beschriebenen Verfahren der paarweisen Gehaltsbestimmung mit parallelen Geraden (Linder, Planen und Auswerten von Versuchen, 3. Auflage, 1969, Birkenhäuser Verlag, Basel).

Bei der Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen von in serumfreiem Medium kultivierten CHO-Zellen wurden die EPO-Präparate CHO 1, CHO 2 bzw. CHO 3 erhalten, welche eine biologische Aktivität von 248 000 (CHO 1), 225 000 (CHO 2) bzw. 186 000 IU/mg (CHO 3) hatten. In vier Ansätzen, bei denen EPO aus Kulturüberständen von humanen Zellen aufgereinigt wurde, erhielt man Produkte mit spezifischen Aktivitäten von 220 000 (HeLa 1), 198 000 (HeLa 2), 204 000 (HeLa 3), 176 000 (HeLa 4) bzw.

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 30 -

100 000 IU/mg (HeLa 5). Die Korrelation der Werte für die biologische Aktivität mit Parametern der Zuckerstruktur ist in Beispiel 11 angegeben.

Beispiel 5

Bestimmung des Gehalts an Sialinsäureresten

5

Die Bestimmung des Sialinsäuregehaltes erfolgte chromatographisch über HPAEC-PAD (High pH Anion Exchange Chromatography mit Pulsed Amperometric Detection) auf einem Dionex System nach enzymatischer Abspaltung der Sialinsäuren mit Neuraminidase aus Arthrobacter ureafaciens

(A. ureaf., Boehringer Mannheim). 10

> Ansätze mit je 22 μ g EPO aus verschiedenen Präparationen aus CHO- und humanen Zellinien (z.B. HeLa S3) wurden auf eine EPO-Konzentration von 0,2 mg/ml in 5 mM Na-Phosphat-Puffer, pH 7,2 eingestellt. Je eine Hälfte jedes Ansatzes wurde für die genaue Bestimmung der EPO Menge über RP-HPLC verwendet. Zur 2. Hälfte der Ansätze wurden je 5 mM U Neuraminidase von A. ureaf. gegeben und über Nacht (ca. 18 h) bei 37°C inkubiert. Anschließend wurden die Verdauansätze halbiert, 20-fach auf 500 μ l mit H_2O verdünnt und $50 \mu l$ davon (entspricht ca. 27 pmol EPO) auf das Dionex System aufgetragen. Hierzu wurden folgende Chromatographie-Parameter verwendet:

Säule:

20

CarboPac PA 100

Fluß:

1,0 ml/min

Detektorempfindlichkeit: 300 nA 25

PCT	Æ.F	20	/07	7876
rc.	Ŀ	70		0/0

WO 99/28346

Gradient:	t (min)	% Puffer B
,	0	17
	. 7	17
	9	100
;	12	100
	13	0
	20	0

Puffer A:

0,1 M NaOH

Puffer B:

0,1 M NaOH; 0,5 M Na-Acetat

- 31 -

10

15

20

5

Die Menge an Sialinsäuren in der aufgetragenen Probe wurde mit Hilfe einer Eichgerade, die aus Werten eines mitgeführten Sialinsäurestandards (Boehringer Mannheim) erhalten wurde, ermittelt. Der Sialinsäuregehalt (mol Sialinsäure/mol EPO) wurde aus dem Ergebnis der Sialinsäurebestimmung (Dionex System) und der Bestimmung der eingesetzten EPO-Menge über RP-HPLC berechnet.

Das EPO aus CHO-Zellen hatte einen mittleren Gehalt von 12,9 mol (CHO 1), 11,8 (CHO 2) bzw. 11,7 mol (CHO 3) Sialinsäure pro mol EPO. Die aus humanen Zellen stammenden EPO-Präparationen hatten einen Anteil von 13,1 mol (HeLa 1), 13,2 mol (HeLa 2), 13,3 mol (HeLa 3), 11,6 mol (HeLa 4) bzw. 10,8 mol (HeLa 5) Sialinsäure pro mol EPO (vgl. auch Beispiel 11).

WO 99/28346

- 32 -

Beispiel 6

Bestimmung der Anteile an bi-, tri- und tetraantennären Kohlenhydratstrukturen

Die Analytik der N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen erfolgte chromatographisch über HPAEC-PAD auf einem Dionex System. Die asialo Oligosaccharide von EPO-Präparationen aus CHO- und humanen Zellinien (z.B. HeLa S3) wurden durch enzymatische Abspaltung mit N-Glycosidase F (Boehringer Mannheim) und Neuraminidase aus A.ureaf. (Boehringer Mannheim) gewonnen.

10

15

20

10 bzw. 30 μ g EPO je Ansatz wurden mittels MicroCon-Ultrazentrifugationseinheiten (Amicon, Ausschlußgröße 10 kD) entsalzt und mit 10 mM Na-Phosphat-Puffer, pH 7,2 auf eine Konzentration von 0,2 bzw. 0,3 mg/ml eingestellt. Anschließend wurde jeder Ansatz mit 1 U N-Glycosidase F und 10 mU Neuraminidase versetzt und über Nacht (ca 18 h) bei 37 °C inkubiert. Zur Abtrennung des EPO-Polypeptidanteils von den abgespaltenen Oligosacchariden wurden die Ansätze nach der Inkubation durch Ultrafree-Zentrifugationseinheiten (Millipore, Ausschlußgröße 10 kD) zentrifugiert und das Ultrafree-Device zweimal mit 20 μ l H $_2$ O nachgewaschen. Die im Durchlauf enthaltenen Oligosaccharide wurden mit H $_2$ O auf 150 μ l aufgefüllt und 100 μ l davon auf dem Dionex System analysiert. Hierzu wurden folgende Chromatographie-Parameter verwendet:

Säule:

CarboPac PA 100

25 Fluß:

1,0 ml/min

Detektorempfindlichkeit:

300 nA

Gradient:	t (min)	% Puffer B
	0	0
	2	0
	60	10
5	62	100
•	67	100
	t (min)	% Puffer B
	69	0
10	80	0

Puffer A:

0,1 M NaOH

Puffer B:

0,1 M NaOH; 0,5 M Na-Acetat

Die Identifikation der Peaks in einem Chromatogramm von N-Zuckern des komplexen Typs erfolgte durch Standard-Oligosaccharide (Oxford Glyco Systems) und wurde durch den enzymatischen Verdau der Oligosaccharide von EPO mit dem Enzym Endo-ß-Galactosidase bzw. Fucosidase und anschließender Analytik auf dem Dionex System verifiziert. Die Berechnung der prozentualen Anteile an bi-, tri- und tetraantennären Strukturen erfolgte über die Flächen der Peaks, die die entsprechende N-Zuckerstruktur repräsentieren, bezogen auf die Gesamtpeakfläche (Summe der Peakflächen von bi-, tri- und tetraantennären Strukturen).

Das aus CHO-Zellen stammende EPO hatte einen Anteil von 4,2% biantennären Kohlenhydratstrukturen, 22,3% triantennären Kohlenhydratstrukturen und 73,5% tetraantennären Kohlenhydratstrukturen (CHO3) bzw.

einen Anteil von 86,7% tetraantennären Kohlenhydratstrukturen in Präparat CHO 1 und 78,6% in CHO 2. Bei den Präparationen von EPO aus humanen Zellinien wurden Anteile an biantennären/triantennären/tetraantennären Strukturen für HeLa 1 von 5,8/8,8/85,4 %, für HeLa 2 von 5,1/12,7/82,2%, für HeLa 3 von 4,1/17,7/78,2%, für HeLa 4 von 10,1/19,2/70,6% und für HeLa 5 von 12,6/25,4/62% erhalten (vgl. auch Beispiel 11).

Beispiel 7 Bestimmung des mittleren Gehalts an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten und des mittleren Anteils an zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats)

Die Gesamtzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in den N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen von EPO (d.h. in den Core-Kohlenhydratstrukturen plus Repeats) wurde aus den Peakflächen der Chromatogramme der Experimente von Beispiel 6 berechnet.

Die Berechnung der Anzahl des mittleren Gehalts (n) von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Kohlenhydratkette war wie folgt.

20

15

wobei

25 % (bi) = prozentualer Anteil biantennärer Strukturen bezogen auf die Gesamtmenge (100%) von N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen

% (tri) = prozentualer Anteil triantennärer Strukturen ohne zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheit

20

25

	% (tetra) =	prozentualer Anteil tetraantennärer Strukturen ohne zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheit
	% (tri + 1r) =	prozentualer Anteil triantennärer Strukturen mit 1 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheit
5	% (tetra + 1r) =	prozentualer Anteil tetraantennärer Strukturen mit 1 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheit
	% (tri + 2r) =	prozentualer Anteil triantennärer Strukturen mit 2 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten
10	% (tetra + 2r) =	prozentualer Anteil tetraantennärer Strukturen mit 2 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten.

Bei EPO aus CHO-Zellen wurde eine mittlere Anzahl von 4,3 (CHO 1), 4,4 (CHO 2) bzw. 4,2 (CHO 3) N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Kohlenhydratkette gefunden. Bei den EPO-Präparationen aus humanen Zellen wurde eine Anzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten von 4,0 (HeLa 1), 4,0 (HeLa 2), 3,9 (HeLa 3), 3,75 (HeLa 4) bzw. 3,6 (HeLa 5) gefunden (vgl. auch Beispiel 11).

Aufgrund der Tatsache, daß EPO 3 N-gebundene Zuckerstrukturen enthält, ist die Gesamtzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten um das 3-fache größer. Bezogen auf die Gesamtglycosilierung von EPO beträgt die Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bei EPO aus CHO-Zellen deshalb 12,9 (CHO 1), 13,2 (CHO 2) bzw. 12,6 (CHO 3). Bei den EPO-Präparaten aus humanen Zellen waren die entsprechenden Werte 12,0 (HeLa 1), 11,9 (HeLa 2), 11,7 (HeLa 3), 11,25 (HeLa 4) und 10,8 (HeLa 5).

Das Produkt aus Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Kohlenhydratstruktur multipliziert mit dem jeweiligen Sialinsäuregehalt ergab bei EPO aus CHO-Zellen Werte von 55,5 (CHO 1), 52 (CHO 2) bzw. 49,3 (CHO 3).

Bei den EPO-Präparaten aus humanen Zellen waren die entsprechenden Werte 52,4 (HeLa 1), 52,5 (HeLa 2), 51,3 (HeLa 3), 43,5 (HeLa 4) und 38,9 (HeLa 5).

Bezogen auf die Gesamtglycosilierung von EPO (3 N-gebundene Kohlenhydratstrukturen) beträgt das Produkt aus Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten, multipliziert mit dem jeweiligen Sialinsäuregehalt bei EPO aus CHO-Zellen 166,5 (CHO 1), 156 (CHO 2) bzw. 147,9 (CHO 3). Bei den EPO-Präparaten aus humanen Zellen waren die entsprechenden Werte 157,2 (HeLa 1), 157,5 (HeLa 2), 153,9 (HeLa 3), 130,5 (HeLa 4) und 116,7 (HeLa 5), vgl. auch Beispiel 11.

Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten die als sogenannte Repeats an die Core-Kohlenhydratstrukturen gebunden sein können (vgl. z.B. Fig. 1). Der Repeatgehalt wird als prozentualer Anteil der repeathaltigen Kohlenhydratstrukturen bezogen auf die Summe aller N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen (bi + tri + tetra = 100%) angegeben.

Dieser Anteil von Repeats kann bei EPO-Präparaten aus CHO-Zellen und aus humanen Zellen unterschiedlich sein. So wurden für die Präparate aus CHO-Zellen Repeatsanteile von 39,6% (CHO 1), 51% (CHO 2) bzw. 36,8% (CHO 3). Für die Präparate aus humanen Zellen wurden die Repeatanteile von 18% (HeLa 1), 16,5% (HeLa 2), 14,0% (HeLa 3), 12,2% (HeLa 4) und 9,8% (HeLa 5) bestimmt (vgl. Beispiel 11).

PCT/EP98/07876

- 37 -

Beispiel 8:

WO 99/28346

Beeinflussung der biologischen Aktivität von EPO durch kontrollierte und bedarfsgerechte Zufütterung

Die Kultivierungen wurden als wiederholt satzweiser Betrieb mit bedarfsgerechter Zufütterung (Repeated Fed Batch) bei einer Temperatur von 36,5 °C durchgeführt. Dazu wurde in einem gerührten Fermenter (Gesamtarbeitsvolumen: 10 L) serumfreies proteinarmes Kulturmedium vorgelegt und einmalig mit einer Inokulumskultur beimpft. Die Zelldichte nach Beimpfen lag im Bereich $3\pm1\times10^5$ lebende Zellen/ml.

10

15

Nach einer Wachstumsphase von 144±24 Stunden wurde ein Teil der Kulturbrühe geerntet. Der Rest der Kulturbrühe verblieb im Fermenter und stellte das Inokulum für die nächste Wachstumsphase dar; dazu wurde der Fermenter wieder bis zum Arbeitsvolumen mit frischem Medium aufgefüllt.

Der EPO-haltige Kulturüberstand wurde durch Zentrifugation der Fermentationskultur erhalten.

Während der Wachstumsphase wurde der Kultur kontinuierlich Nährstofflösung zugeführt. Dazu wurde ein Vorratsgefäß mit Nährlösung an den Fermenter gekoppelt. Die Nährstofflösung enthielt Aminosäuren, Vitamine, Insulin, Spurenelemente, Salze, Glutamin und Kohlenhydrate. Es wurden 2 Fermentationen wie folgt durchgeführt:

25

Bei der Fermentation A enthielt die Nährstofflösung als Zucker D-(+)-Glucose und bei der Fermentation B die Zucker D-(+)-Glucose, D-(+)-Galactose und D-(+)-Mannose. Das Masseverhältnis von Glutamin zu

den Zuckern betrug bei Fermentation B 1:2,2:3,6:6. Die Konzentration der einzelnen Zucker in der Nährstofflösung lag zwischen 7,2 und 18 g/l.

Die Glutaminkonzentration in der Kultur wurde bei Fermentation B

periodisch analysiert und der Verbrauch berechnet. Der momentane

Volumenstrom der Nährstofflösung wurde dem Bedarf der Zellen an

Nährstoffen angepaßt. Bei Fermentation A wurde die

Glutaminkonzentration nicht als Regelgröße verwendet. Die

Nährstofflösung bei der Fermentation B enthielt eine Mischung der Zucker

D-(+)Glucose, D-(+)Galactose und D-(+)Mannose im Massenverhältnis

von 2:3:5. Während der Kultivierung wurde durch entsprechende

Zufütterung die Konzentration aller Zucker im Fermenter in einem Bereich

von 2 bis 6 g/l gehalten.

- Die Zelldichte veränderte sich durch das Wachstum auf mehr als $20x10^5$ Zellen/ml, typischerweise $30\pm10x10^5$ Zellen/ml zum Erntezeitpunkt. Die Konzentration an EPO betrug zum Erntezeitpunkt typischerweise 40 ± 10 mg/l.
- Aus geernteten Kulturbrühen wurde die Konzentration an humanem Erythropoietin z.B. durch ELISA bestimmt. Eine prozentuale Verteilung der auftretenden Isoformen dieses Proteins wurden z.B. durch Trennung mittels Kapillarzonenelektrophorese (CZE) bestimmt.
- Tabelle 1 zeigt den Vergleich der EPO-Isoformenverteilung zwischen einer Fermentation A mit Zufütterung einer Nährstofflösung mit Glucose und einer Fermentation B mit kontrollierter und bedarfsgerechter Zufütterung einer Nährstofflösung mit Glucose, Mannose und Galactose. Der Anteil der EPO-Isoformen bei Fermentation B wurde als prozentualer Anteil der korrespondierenden Isoformen der Fermentation A berechnet. Letztere

wurden auf jeweils 100% normiert. Die Daten belegen, daß die erwünschten höher glykosilierten EPO-Isoformen 2-4 während der Fermentation gegenüber der Fermentation A in maßgeblich höheren Anteil vorliegen.

Tabelle 1:

5

10

15

20

25

30

Isoformbezeich- nung in der CZE	1	2	3	4	5	6	7	8
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Fermentation A: Zufütterung mit Glucose	n.b.	100	100	100	100	100	100	100
Fermentation B: bedarfsgerechte Zufütterung mit Glucose, Mannose und Galactose	n.b.	136	140	115	102	91	76	55

n.b.= nicht bestimmbar, da Wert unter Nachweisgrenze

Das bei Zufütterung erhaltene Isoformenmuster war bei vier aufeinanderfolgenden Ernten aus einer Fermentation mit kontrollierter und bedarfsgerechter Zufütterung der Nährstofflösung reproduzierbar.

Beispiel 9: Beeinflussung der biologischen Aktivität von EPO durch Veränderung der Kultivierungstemperatur

Die Durchführung erfolgte wie in Beispiel 8 (Fermentation B) beschrieben im Fed-Splitbatch-Verfahren mit kontrollierter und bedarfsgerechter Zufütterung, außer daß die Fermentertemperatur 35,0 °C anstelle von 36,5 °C betrug und die Fermentation im 1000 I Maßstab durchgeführt wurde.

Tabelle 2 zeigt den Vergleich der EPO-Isoformenverteilung zwischen einer Fermentation C bei 36,5 °C und einer Fermentation D bei 35,0 °C jeweils mit kontrollierter Zufütterung einer Nährstofflösung. Der Anteil der EPO-Isoformen bei Fermentation D wurde als prozentualer Anteil der korrespondierenden Isoformen der Fermentation C berechnet. Letztere wurden auf jeweils 100 % normiert. Die Daten belegen, daß die sauren EPO-Isoformen 2 bis 4 durch Absenkung der Temperatur maßgeblich angehoben werden.

Tabelle 2:

10

15

30

Isoformbezeich- nung in der CZE	1	2	3	4	5	6	7	8
Relative Isoformenverteilung	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Fermentation C: Temperatur 36,5 °C:	n.b.	100	100	100	100	100	100	100
Fermentation D:	n.b.	131	116	110	94	100	88	86
Temperatur 35,0 °C:								

20 n.b.= nicht bestimmbar, da Wert unter Nachweisgrenze

Beispiel 10: Beeinflussung der biologischen Aktivität von EPO durch Veränderung der Kohlenhydratzusammensetzung im Medium

Das im folgenden dargelegte Verfahren belegt die Möglichkeit, die Qualität von humanem Erythropoietin durch Veränderung des Kohlenhydratangebotes im Zufütterungsmedium zu verändern.

Es werden zwei Varianten des oben beschriebenen Verfahrens gezeigt (nachfolgend Fermentation E und Fermentation F genannt), die sich durch die Zusammensetzung der verwendeten Medien unterscheiden.

Für beide Ansätze basierte die Rezeptur des Kulturmediums auf modifiziertem eRDF-Medium. Es wurde kein Serum eingesetzt, sondern rekombinantes Insulin (einziger Proteinzusatz) und weitere Supplemente (z.B. Selenit, Putrescin, Hydrocortison, Eisensulfat), die üblicherweise bei serumfreien bzw. proteinfreien Medien eingesetzt werden.

Die Zufütterungs-Nährlösung basiert ebenfalls auf modifiziertem eRDF-Medium, enthält jedoch nicht die Salze KCl, Na₂HPO₄ und NaCl.

Der maßgebliche Unterschied der Fermentationen E und F liegt im Zusatz von verschiedenen Monosacchariden zum Zufütterungsmedium.

Fermentation E:

Es wurde für Fermentation E der üblicherweise eingesetzte Zucker D-(\pm)-Glucose verwendet. Die Startkonzentration betrug 3 g/l. Durch eine geeignete Zufütterung der glucosehaltigen Nährlösung wurde die Glucosekonzentration in der Kulturbrühe bei 3 \pm 0,5 g/l während der gesamten Kultivierung konstant gehalten.

20

Die Kultivierungsdauer lag typischerweise bei 100 \pm 20 h. Die Konzentration an EPO betrug zum Erntezeitpunkt typischerweise 40 ± 10 mg/l.

Fermentation F:

25

Für die Fermentation F wurden zusätzlich zu D-(+)-Glucose die Zucker D-(+)-Galactose und D-(+)-Mannose im Masseverhältnis von ca. 1:2:3 für das Zufütterungsmedium eingesetzt. Während der Kultivierung wurde durch

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

entsprechende Zufütterung die Konzentration aller Zucker in einem Bereich zwischen 0,25 g/l und 3,5 g/l gehalten.

Die Kultivierungsdauer für diese Wachstum lag typischerweise bei 100 ± 20 Stunden. Die Konzentration an EPO betrug zum Erntezeitpunkt typischerweise 40 ± 10 mg/l.

Erythropoietin wurde aus den Kulturüberständen aufgereinigt. Das durchgeführte Aufreinigungsverfahren war so ausgelegt (siehe Beispiel 2), daß die Verteilung von relevanten Isoformen des Glykoproteins nicht beeinflußt wurde.

Die Isoformenverteilung des gereinigten Erythropoietin wurde wie zuvor beschrieben bestimmt.

15

20

25

10

Die Kohlenhydratstrukturen der Isoformen von humanem Erythropoietin und ihre Verteilung unterscheiden sich in den geernteten Kulturüberständen von Fermentation E zu Fermentation F. Die Fermentation E zeigt einen deutlich höheren Anteil der Isoformen 2, 3 und 4 gegenüber Fermentation F. Diese Unterschiede werden durch eine Zufütterung der Monosaccharide Mannose und Galactose bewirkt (vgl. Fig. 2).

Die biologische Aktivität, bestimmt durch den Normo-Maus-Test (Beispiel 4), korreliert mit der Verteilung und den Kohlenhydratstrukturen der EPO-Isoformen (Fig. 3). Die Kohlenhydratstrukturen der aus den Kulturüberständen E und F erhaltenen EPO-Präparationen wurden mit CZE- und HPAEC-Analytik untersucht.

In Tabelle 3 sind die Antennärität (Gehalt an Bi- Tri- und Tetrastrukturen), der Gehalt an N-Acetyl-Lactosamineinheiten (LE), der Sialinsäuregehalt (SA) und das Produkt aus LE und SA der beiden EPO-Präparationen dargestellt.

Tabelle 3

	bi [%]	tri [%]	tetra [%]	SA- Gehalt	LE- Gehalt	LExSA
Fermentation E	12,6	25,4	62,0	10,8	10,8	116,7
Fermentation F	10,1	19,2	70,6	11,6	11,25	130,5

Beispiel 11: Korrelation der spezifischen Aktivität und Kohlenhydratstrukturen

In diesem Beispiel sind Untersuchungen zur Abhängigkeit der biologischen Aktivität einzelner EPO-Isoformen von den Kohlenhydratstrukturen zusammengefaßt. Dabei wurden Isoformen (IF) aus verschiedenen EPO-Quellen (verschiedene Chargen von EPO aus CHO-Zellen und humanen Zellen) isoliert und verglichen.

10

15

25

- 11.1 Isolierung individueller Isoformen von EPO mittels isoelektrischer Fokussierung (IEF) und Western Blot
- A) Durchführung der IEF-Gelelektrophorese und Elektroblotting auf Nitrozellulose

Zur Isolierung einzelner Isoformen in reiner Form wurde eine EPO-Lösung bestehend aus einem Gemisch mehrerer Isoformen in Ultrafree-Zentrifugationseinheiten entsalzt und aufkonzentriert (5-10 mg/ml). 350-1000 μ g dieser Lösung wurden auf ein IEF-Polyacrylamid-Fertiggel von Serva (Servalyt Precotes, pH 3-5, 300 μ m, 125 x 125 mm) aufgetragen (in 5-10 Bahnen mit 70-100 μ g EPO pro Bahn). Die IEF wurde bei 2500 V für 3,5 h bei 5°C durchgeführt; anschließend wurde das Gel auf Nitrozellulose geblottet (Naßblot in Tris/Glycin-Puffer mit Methanol, aber ohne SDS für 3 h bei 200 mA). Nach dem Blotvorgang wurde das Gel entfernt und die Nitrozellulosemembran mit Ponceau S angefärbt. Die gefärbten Isoformen wurden ausgeschnitten und mit H_2 O oder TBS-Puffer (100 mM Tris, pH 7,4; 150 mM NaCl) wieder vollständig entfärbt.

20 B) Extraktion der Isoformen von der Membran

Die entfärbten Nitrozellulosestreifen mit den jeweils entsprechenden Isoformen wurden in 2 ml Eppendorfgefäße gegeben (entsprechend 3-4 Bahnen des IEF-Gels), 1,5 ml Aceton zugegeben und die Nitrozellulose durch Vortexen gelöst. Zur optimalen Ausfällung des EPO wurde über Nacht bei -20°C inkubiert. Anschließend wurde das EPO-haltige Präzipitat für 10 min in einer Tischzentrifuge bei 14000 Upm isoliert. Der Niederschlag wurde 2-3 mal mit 1 ml Aceton gewaschen und danach bei Raumtemperatur oder 37°C unter Stickstoffstrom getrocknet. Das EPO-Präzipitat wurde anschlie-

10

15

20

25

30

Rend in 20 mM Na-Phosphat-Puffer, pH 7,2 mit 0,01% Tween 20 gelöst und bis zur weiteren Analyse bei -20°C gelagert.

C) Isolierung von Isoformen aus vorfraktionierten EPO-Lösungen

Die Isolierung einzelner Isoformen wurde wie in A) und B) beschrieben durchgeführt, mit der Einschränkung, daß die verwendeten EPO-Ausgangslösungen nicht 7-8, sondern nur 3-4 Isoformen enthielten. Ausgangsmaterial waren EPO-Fraktionen, die durch eine DE-Chromatographie (Anionenaustauscher) gewonnen wurden. Diese Fraktionen enthielten nur 3-4 Isoformen (z.B. Isoform 6-8 oder Isoform 1-4). Für die Isolierung der "Isoformenpakete" wurde eine geeignete Chromatographiesäule mit 1-2 ml DEAE-Sepharose ff pro 10 mg EPO im Auftrag gefüllt umd mit 0,5 M NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule zunächst mit 2 SV Neutralisierungspuffer und dann mit mindestens 5 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

Eine gereinigte EPO-Präparation bestehend aus 8 Isoformen wurde bei einer Temperatur von $5\pm4^{\circ}$ C und einer Flußrate von bis zu 15 SV/h aufgezogen. Die Säule wurde dann mit 2 bis 3 SV Äquilibrierpuffer gewaschen und anschließend solange mit Waschpuffer gespült, bis der pH-Wert bei 5,0 lag (ca. 5 SV).

Die Elution von verschiedenen Isoformenpaketen wurde durch Erhöhung der NaCI-Konzentration im Elutionspuffer in 10 mM-Stufen beginnend bei 20 mM NaCI erreicht. Die basischen Isoformen binden schwächer an den Ionenaustauscher und eluieren entsprechend bei niedrigen Ionenstärken, die sauren Isoformen eluieren bei höheren NaCI-Konzentrationen bis 70 mM NaCI. Die Menge der bei einer bestimmten NaCI-Konzentration eluierten Isoformen hängt stark vom Ausgangsmaterial und dem Elutionsvolumen ab.

20

25

Auf den einzelnen Stufen wurde in der Regel so lange eluiert, bis die OD280 auf etwa 50% des Maximalwertes bei dieser NaCl-Konzentration abgesunken war. Dies entsprach zwischen 15 und 40 SV. Durch zusätzliche Fraktionierung der eluierten Isoformenpakete innerhalb einer NaCl-Konzentration wurde eine weitere Auftrennung der Isoformen erreicht. Die Laufgeschwindigkeit der Säule betrug bis zu 15 SV/h.

Neutralisationspuffer: 100 mM Na/K-Phosphat, pH 7,5 \pm 0,2

Äquilibrierpuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, pH 7,5 \pm 0,2

10 Waschpuffer: 30 mM NaAc/HAc, pH 5,0 \pm 0,2

Elutionspuffer: 10 mM NaAc/HAc, pH 5,0 \pm 0,2, 20 mM NaCl,

bzw. Erhöhung der Konzentration in 10 mM

Schritten bis 70 mM NaCl

Aus den so erhaltenen Isoformenpaketen wurden einzelne, reine Isoformen durch Aufreinigung wie in A) und B) beschrieben gewonnen.

Die Nummerierung der aus A-C gewonnenen reinen Isoformen (IF) wurde entsprechend ihres isoelektrischen Punktes (pl) von sauer nach basisch vorgenommen. Isoform 2 (IF2) ist die am stärksten saure isolierte Isoform mit dem niedrigsten pl, Isoform 8 ist die am stärksten basische mit dem höchsten pl. Isoform 2 war die Isoform mit dem niedrigsten pl, die in ausreichenden Mengen aus dem Ausgangsgemisch isoliert werden konnte. Isoform 1 war nur zu 1-2% im Ausgangsgemisch enthalten, so daß für eine vollständige Analyse keine ausreichenden Mengen gewonnen werden konnten.

- 10

Es wurden folgende Analysen zur Charakterisierung der reinen Isoformen durchgeführt:

- Bestimmung der Menge und der Ausbeute mittels RP-HPLC
- Bestimmung der Reinheit und Identität durch Kapillarelektrophorese und Isoelektrische Fokussierung

Die Ausbeute an individuellen Isoformen betrug im allgemeinen zwischen 20% und 30% der im Ausgangsgemisch eingesetzten Isoform.

Die Reinheit der Isoformen war in der Regel > 90%, meist sogar > 94%.

11.2 Ergebnisse

Von den gereinigten Isoformen (IF) wurden folgende Daten erhoben:

- Relative Verteilung der N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen (Anteil an bi-, tri- und tetraantennären Strukturen an der Gesamtglycosilierung) und des Repeatgehalts
- biologische Aktivität im Normo-Maus-Test
- Sialinsäuregehalt

20

15

Diese Bestimmungen wurden im wesentlichen nach den zuvor bereits beschriebenen Methoden durchgeführt.

Der Sialinsäuregehalt isolierter Isoformen wurde nicht für jede einzelne
Isoformpräparation separat ermittelt, sondern wurde für jede der Isoformen
2-8 von EPO aus CHO-Zellen bzw. Isoformen 2-6 von EPO aus humanen
Zellen beispielhaft an 1-3 Präparationen bestimmt.

WO 99/28346 PCT/EP98/07876

Zur Berechnung des Produktes aus Gehalt an N-Acetyl-Lactosamineinheiten (LE-Wert) und dem Sialinsäuregehalt (SA) wurden die gerundeten, ganzzahligen Sialinsäurewerte jeder Isoform verwendet.

Diese gerundeten SA-Werte waren für EPO aus CHO-Zellen und humanen Zellen wie folgt: 14 (IF2), 13 (IF3), 12 (IF4), 11 (IF5), 10 (IF6), 9 (IF7) und 8 (IF8).

10

15

20

25

30

Die Tabelle 4 enthält Angaben zur Korrelation zwischen spezifischer Aktivität und Kohlenhydratstrukturen von verschiedenen EPO-Präparaten aus CHO-Zellen (CHO 1, CHO 2 und CHO 3) sowie aus humanen Zellen (HeLa 1 bis 5). Die Tabelle zeigt die Korrelation zwischen der biologischen Aktivität und der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosaminheinheiten (LE) im EPO-Molekül, dem mittleren Sialinsäuregehalt (SA) sowie dem Produkt LE x SA.

Die Tabelle 5 enthält Angaben zur Korrelation zwischen der biologischen Aktivität und der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosaminheinheiten (LE) im EPO-Molekül, dem mittleren Sialinsäuregehalt (SA) sowie dem Produkt LE x SA von isolierten Isoformen einer nicht vorfraktionierten EPO-Charge aus CHO-Zellen.

Die Tabelle 6 enthält einen Vergleich verschiedener Präparationen (A und B) einer Isoform (IF2 bzw. IF5), die aus unterschiedlichen Fraktionen einer vorfraktionierten EPO-Charge aus CHO-Zellen isoliert wurde, d.h. von der Isoform 2 bzw. 5 wurden je 2 Präparationen (A und B) analysiert. Die Vorfraktionierung erfolgte über einen DE-Anionenaustauscher, wie in Beispiel 11.1.C beschrieben. Die beiden Präparationen A und B der Isoform IF2 bzw. IF5 wurden aus unterschiedlichen Fraktionen der DE-Säule isoliert (IF2 aus den Fraktionen 5 und 6 und IF5 aus den Fraktionen 2 und 3). Die Fraktion

5 bzw. 2, aus der IF2/A bzw. IF5/A isoliert wurde, eluierte früher (bei geringerer Salzkonzentration) von der DE-Sepharose-Säule als die Fraktion 6 bzw. 3, aus der IF2/B bzw. IF5/B isoliert wurde. Die Präparationen A und B der Isoform 2 bzw. 5 unterscheiden sich aber nicht in ihrem Verhalten bei der anschließenden isoelektrischen Fokussierung oder in der Kapillarelektrophorese, d.h. beide Präparationen von IF2- bzw. IF5 haben den gleichen Sialinsäuregehalt. Überraschenderweise wurde jedoch festgestellt, daß die Isoformen aus der Präparation A aufgrund ihres höheren LE-Werts bzw. des höheren Anteils an Repeat-Strukturen eine signifikant höhere biologische Aktivität aufweisen als die entsprechenden Isoformen aus Präparation B. Die in Tabelle 6 beschriebene Abhängigkeit der biologischen Aktivität einer Isoform von der Gesamtzahl der im EPO-Molekül enthaltenen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bei gleichen Sialinsäuregehalt, wurde nicht nur für Isoform 2 und 5, sondern auch für andere Isoformen beobachtet.

15

10

Die Tabelle 7 vergleicht entsprechende Isoformen aus verschiedenen EPO-Quellen (CHO-Zellen oder humane HeLa S3-Zellen). Auch hier wird eine Korrelation der biologischen Aktivität mit dem LE x SA-Wert gefunden.

In allen Tabellen ist somit eine Korrelation des Produkts aus Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (LE) mit dem Sialinsäuregehalt (SA) und der biologischen Aktivität zu erkennen. Ein hoher Wert des Produkts LE X SA ist stets mit einer hohen biologischen Aktivität assoziiert.

Tabelle 4:

Bezeichnung	tetra- ant. (in %)	repeat (in%)	LE	SA mol/- mol	LExSA	spezif. Akt. KU/mg
CHO 1	86,7	39,6	12,9	12,9	166,4	248
CHO 2	78,6	51	13,2	11,8	155,8	225
CHO 3	73,5	42,6	12,6	11,7	147,4	186
HeLa 1	85,4	18,0	12,0	13,1	157,2	220
HeLa 2	82,2	16,5	11,9	13,2	157,1	198
HeLa 3	78,2	14,0	11,7	13,3	155,6	204
HeLa 4	70,6	12,2	11,25	11,6	130,5	176
HeLa 5	62	9,8	10,8	10,8	116,7	100

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten

SA: Sialinsäuregehalt des EPO-Präparats

1: %-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen (bi + tri + tetra = 100%)

Tabelle 5

		tetra- ant. (in %)	repeat¹ (in %)	LE	SA mol/mol	LExSA	spezif. Akt. KU/mg
	IF2	98	48	13,7	14	191,1	400
	IF3	86	43	13,1	13	170,3	280
	IF4	75	40	12,6	12	151,2	200
	IF5	64	39	12,0	11	132	150
	IF6	56	41	11,4	10	114	75
•	IF7	42	39	11,1	9,0	100	40
	IF8	34	33	10,5	8,0	84	19

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten (berechnet wie in Beispiel 7)

30 SA: Sialinsäuregehalt der jeweiligen Isoform.

%-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen (bi + tri + tetra = 100%)

15

10

20

Tabelle 6

	tetra- ant. (in %)	repeat ¹ (in %)	LE	SA mol/mol	LExSA	spezif. Akt. KU/mg
IF2/A	99	54	14,1	14	197,4	396
IF2/B	97	31	12,9	14	180,6	330
IF5/A	64	58	13,2	11	145,2	206
IF5/B	55	32	11,4	11	125,4	112

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten (berechnet wie im Beispiel 7 beschrieben)

SA: Sialinsäuregehalt der jeweiligen Isoform

1 %-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen (bi + tri + tetra = 100%)

Tabelle 7

IF5 (CHO 2)

1F5 (CHO 3)

IF5 (HeLaS3)

15		tetra- ant. (in %)	repeat¹ (in %)	LE	SA mol/mol	LexSA	spezif. Akt. KU/mg
	IF2 (CHO 2)	99	58	14,4	14	201,6	440
	IF2 (CHO 3)	98	48	13,7	14	191,8	400
	IF2 (HeLaS3)	99	24	12,9	14	118,8	240

48

39

15

20

10

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten (berechnet wie in Beispiel 7 beschrieben)

12,9

12,0

10,8

11

11

11

141,9

132,0

119,0

175

150

60

25 SA: Sialinsäuregehalt der jeweiligen Isoform

68

64

70

%-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen (bi + tri + tetra = 100%) WO 99/28346 PCT/EP98/07876

- 52 -

Figur 4 zeigt am Beispiel individueller Isoformen die Abhängigkeit der biologischen Aktivität von EPO vom Anteil an N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen mit zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats). Die Isoformen wurden aus EPO-Präparationen mit unterschiedlichem Anteil an Repeat-haltigen Kohlenhydratstrukturen isoliert (EPO 1 mit ca. 50%, EPO 2 mit ca. 40% und EPO 3 mit ca. 15% repeathaltiger Strukturen). Die biologische Aktivität entsprechender Isoformen (gleicher Gehalt an Sialinsäuren und etwa gleiche Antennärität) ist um so geringer, je niedriger der Anteil an Repeat-haltigen Kohlenhydratstrukturen in den Isoformen ist. Dieses Merkmal ist von Isoform 2 bis mindestens Isoform 7 zu beobachten.

Ansprüche

1. EPO-Zusammensetzung,

dadurch gekennzeichnet,

daß sie im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen Anteil von mindestens 75% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von N-gebundenen Kohlenhydratketten enthalten.

10

15

20

5

2. EPO-Zusammensetzung,

dadurch gekennzeichnet,

daß sie aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht, die einen mittleren Anteil von mindestens 75% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von N-gebundenen Kohlenhydratketten enthalten.

entilateri.

EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Anteil der tetraantennären Strukturen mindestens 80% ist.

4. EPO-Zusammensetzung,

dadurch gekennzeichnet,

daß sie im wesentlichen aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht, die eine Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls bzw. von durchschnittlich mindestens 11.1 N-Aectyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls enthalten.

30

15

20

25

30

- 5. EPO-Zusammensetzung,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß sie aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht, die eine mittlere
 Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7 N-Acetyl-LactosaminEinheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette bzw.
 von durchschnittlich mindestens 11,1 N-Aectyl-LactosaminEinheiten bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPOMoleküls enthalten.
- 6. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 4 oder 5,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten mindestens 4,0
 bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette bzw. 12.0
 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung ist.

 EPO-Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet,

daß sie im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 43,3 bzw. mindestens 130 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls aufweisen.

 EPO-Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet,

daß sie aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen mittleren Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 43,3

bzw. mindestens 130 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls aufweisen.

- 9. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 7 oder 8,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Wert des Produkts mindestens 46,7 bezogen auf eine Ngebundene Kohlenhydratkette bzw. mindestens 140 bezogen auf die
 Gesamt-N-Glycosilierung ist.
- 10. EPO-Zusammensetzung,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß sie die Merkmale von mindestens zwei der Ansprüche 1, 2, 4,
 5, 7 und 8 aufweist.
- 11. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Gemisch aus 2 bis 5 Isoformen umfasst.
- 12. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 11,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß sie ein Gemisch aus 3 bis 4 Isoformen umfasst.
- EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
 daß sie eine spezifische Aktivität in vivo von mindestens
 175 000 IU/mg Protein aufweist.
- EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß sie eine spezifische Aktivität in vivo von mindestens
 200 000 IU/mg Protein aufweist.

25

- 15. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der mittlere Sialinsäuregehalt pro Molekül mindestens 11 beträgt.
- 16. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die EPO-Moleküle das Produkt einer Expression exogener DNA in Säugerzellen sind.
- 17. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 16,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß sie aus glykosilierten EPO-Molekülen aus CHO-Zellen besteht,
 wobei der Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-LactosaminVerlängerungen (Repeats) bezogen auf die Gesamtzahl von Ngebundenen Kohlenhydratketten mindestens 30% ist.
- 18. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 17,
 dadurch gekennzeichnet,

 daß der Wert für das Produkt aus dem Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten und dem Anteil von tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten mindestens 2400 ist.
 - 19. EPO-Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die EPO-Moleküle das Produkt einer Expression endogener DNA in humanen Zellen sind.

- 20. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 19,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-LactosaminRepeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten
 mindestens 10% ist.
- 21. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 20,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Wert für das Produkt aus dem Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl
 von Kohlenhydratketten und dem Anteil von tetraantennären.
 Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten
 mindestens 800 ist.
- 15 22. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 16 oder 19,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Kultivierung der Zellen in einem serumfreien Medium erfolgt
 ist.
- 23. Pharmazeutisches Präparat,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß es als Wirkstoff eine EPO-Zusammensetzung nach einem der
 Ansprüche 1 bis 22 als Wirkstoff gegebenenfalls zusammen mit
 üblichen pharmazeutischen Verdünnungs-, Hilfs- und Trägermitteln
 enthält.
 - 24. Verfahren zur Gewinnung einer EPO-Zusammensetzung, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet,
- daß man die EPO-Zusammensetzung mit den gewünschten Merkmalen erhält durch mindestens eine der Maßnahmen:

10

20

25

30

- (a) Auswahl einer geeigneten Produktionszelle, welche in der Lage ist, Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen,
- (b) Auswahl von geeigneten Kultivierungsbedingungen bei der Zellkultur, um Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen und
- (c) Abtrennung unerwünschter Bestandteile aus einer bekannten Zusammensetzung von EPO-Molekülen unter Anreicherung von EPO-Molekülen, die Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten enthalten.
- Verfahren nach Anspruch 24,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß Maßnahme (b) die Zugabe einer Mischung von mindestens 2
 Kohlenhydraten und vorzugsweise mindestens 3 Kohlenhydraten
 zum Kulturmedium umfaßt.

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß eine Glucose oder/und Mannose oder/und Galactose enthaltende Kohlenhydratmischung verwendet wird.

27. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß Maßnahme (b) die kontrollierte und bedarfsgerechte Zugabe von Nährstoffen, umfassend mindestens eine essentielle Aminosäure oder/und mindestens ein Kohlenhydrat abhängig vom Bedarf der Zellen umfaßt.

20

25

- Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß der Nährstoffbedarf der Zellen abhängig von der im Kulturmedium gemessenen Konzentration an Glutamin ermittelt wird.
- 29. Verfahren nach Anspruch 27 oder 28,

 dadurch gekennzeichnet,

 daß die Nährstoffe bedarfsgerecht über die gesamte

 Wachstumsphase der Zellen zugegeben werden.
- 30. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 29,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Nährstoffe eine Mischung von mindestens 2 Kohlenhydraten
 und vorzugsweise mindestens 3 Kohlenhydraten umfassen.
 - 31. Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 30,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß Maßnahme (b) die Kultivierung bei einer Temperatur zwischen
 30 und 35,5°C, bevorzugt zwischen 33 und 35,0°C umfaßt.
 - 32. Verfahren nach Anspruch 24,

 dadurch gekennzeichnet,

 daß Maßnahme (c) einen Reverse-Phase-Chromatographieschritt bei
 einem pH-Wert im Bereich von 6-8 umfaßt.
 - 33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daß ein Acetonitril-, Ethanol- oder Isopropanol als Eluent verwendet wird.

10

15

20

- Verfahren nach Anspruch 24,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß Maßnahme (c) einen Affinitätschromatographieschritt unter
 Verwendung von Triazinfarbstoffen umfaßt.
- 35. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß Maßnahme (c) einen Affinitätschromatographieschritt unter Verwendung von Lectinen umfaßt.
- Verfahren zur Erhöhung der spezifischen Aktivität einer EPO-Zusammensetzung,

dadurch gekennzeichnet,

daß man EPO-Moleküle in der Zusammensetzung anreichert, die

- (a) einen hohen Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen,
- (b) eine große Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten,
- (c) einen hohen Wert des Produkts aus der Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten und dem Sialinsäuregehalt,
- (d) einen hohen Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Repeats oder/und
- (e) einen hohen Wert des Produkts aus dem Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats und dem Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen aufweisen.
- 25 37. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet,

daß die Anreicherung bis auf einen mittleren Anteil von mindestens 75% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten erfolgt.

20

25

- 38. Verfahren nach Anspruch 36,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Anreicherung bis auf eine mittlere Anzahl von mindestens
 3,7 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene
 Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls bzw. von durchschnittlich
 mindestens 11.1 N-Aectyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die
 Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls erfolgt.
- 39. Verfahren nach Anspruch 36,


 dadurch gekennzeichnet,

 daß die Anreicherung bis auf einen Wert des Produkts aus der mittleren Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt von mindestens


 43,3 bzw. bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls auf einen Wert von 130 erfolgt.
 - 40. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daß die Anreicherung
 - (a) bei EPO aus CHO-Zellen, bis auf einen mittleren Anteil von mindestens 30% N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten oder
 - (b) bei EPO aus humanen Zellen bis auf einen mittleren Anteil von mindestens 10% N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten erfolgt.
 - 41. Verfahren nach Anspruch 36,dadurch gekennzeichnet,daß die Anreicherung
 - (a) bei EPO aus CHO-Zellen bis auf einen Wert des Produkts aus dem mittleren Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats

- bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten multipliziert mit dem mittleren Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen von mindestens 2400 oder
- (b) bei EPO aus humanen Zellen bis auf einen Wert des Produkts aus dem mittleren Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten multipliziert mit dem mittleren Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen von mindestens 800 erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 36-41,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Anreicherung durch eine oder mehrere der Maßnahmen (a),
 (b) und (c) gemäß Anspruch 24 erfolgt.


Figur 1: Tetraantennäre N-gebundenene Kohlenhydratstruktur mit zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats) und Sialinsäuren




Figur 2



Figur 3







Inte Jonal Application No PCT/EP 98/07876

A. CLASSIF IPC 6	C12N15/18 C12N15/16 C12N15/8 C12N5/10 A61K38/18	5 C12N5/06	C12N5/08
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	currentation searched (classification system followed by classification C12N C07K	on symbois)	
	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included. In the	a fields searched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search te	rms used)
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.
Y	TAKEUCHI M ET AL: "RELATIONSHIP SUGAR CHAIN STRUCTURE AND BIOLOGI ACTIVITY OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN PRODUCED IN CHINES OVARY CELLS" PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADE SCIENCES OF USA, vol. 86, October 1989, pages 7819 XP002053701 cited in the application see pages 7821-7822 and figure 3	CCAL SE HAMSTER EMY OF	1-6, 9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42
X Funti	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members	are listed in annex.
	stenories of cited documents :		
"A" docume consic filling c filling c "L" docume which citatio "O" docume other i "P" docume later ti	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	cited to understand the princ invention "X" document of particular releva cannot be considered novel involve an inventive step wh "Y" document of particular releva cannot be considered to inventive to inventive the principal of the particular releva cannot be considered to inventive the principal of the particular relevance to inventive the principal of the particular relevance to the principal of the princip	nflict with the application but ciple or theory underlying the nce; the claimed invention or cannot be considered to sen the document is taken alone nce; the claimed invention obve an inventive step when the one or more other such docuping obvious to a person skilled ne patent family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the interna	alional search report
1	4 May 1999	21/05/1999	
Name and t	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Eav. (-31-70) 340-3016	Authorized officer Mateo Rosell	, A.M.

Inti ional Application No PCT/EP 98/07876

ategory °	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	EP 0 754 703 A (KIRIN BREWERY) 22 January 1997	1-6, 9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42
	see column 2, line 43 - column 3, line 15 see column 12, line 35-38 see column 7, line 15 - column 8, line 7	
Х	WO 95 12684 A (AMGEN INC) 11 May 1995 see page 4, line 11 - page 5, line 28	1,26-31
A	US 5 047 335 A (PAULSON JAMES ET AL) 10 September 1991 see column 3, line 30 - column 4, line 43	1,7,8, 11,12, 15,16,19
A	FUKUDA M N ET AL: "SURVIVAL OF RECOMBINANT ERYTHROPOIETIN IN THE CIRCULATION: THE ROLE OF CARBOHYDRATES" BLOOD, vol. 73, no. 1, January 1989, pages 84-89, XP000199651 cited in the application see the whole document and in particular page 88, column and figure 6	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	WATSON E ET AL: "STRUCTURE DETERMINATION OF THE INTACT MAJOR SIALYLATED OLIGOSACCHARIDE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS" GLYCOBIOLOGY, vol. 4, no. 2, 1 January 1994, pages 227-237, XP000576965 see the abstract, table and discussion.	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	NIMTZ M ET AL: "STRUCTURES OF SIALYLATED OLIGOSACCHARIDES OF HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN RECOMBINANT BHK-21 CELLS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, vol. 213, no. 1, 1 April 1993, pages 39-56, XP000576796 see pages 45-46, table 4 and discussion.	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
-		

Inte ional Application No PCT/EP 98/07876

		101/21 30/	
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	ļ F	elevant to claim No.
A	HOKKE C H ET AL: "STRUCTURAL ANALYSIS OF THE SIALYLATED N- AND O-LINKED CARBOHYDRATE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS. SIALYLATION PATTERNS AND BRANCH LOCATION OF DIMERIC N-ACETYLLACTOSAMINE UNITS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, vol. 228, March 1995, pages 981-1008, XP000199646 see figures and page 1002, discussion and table 5.		1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
Α .	CHOI D ET AL: "Erythropoietin: physico- and biochemical analysis" JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B: BIOMEDICAL APPLICATIONS, vol. 687, no. 1, 6 December 1996, page 189-199 XP004062816 see the whole document and in particular pages 194-196 and figure 4.	5	1
A	EP 0 475 354 A (BEHRINGWERKE AG) 18 March 1992 see page 2-3		1,8,11, 12,15,16
A	WO 96 35718 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH; BURG JOSEF (DE); SCHNEIDER WALTER (DE);) 14 November 1996 see the whole document		1,32-34
A	EP 0 267 678 A (INTEGRATED GENETICS, INC.) 18 May 1988 see the whole document and in particular page 5, lines 54-58.		1,22, 32-34
		·	

Information on patent family members

Inte onal Application No PCT/EP 98/07876

Patent document cited in search repo	rt	Publication date		olication date
EP 0754703	A	22-01-1997	US 5843713 A 01- CN 1142229 A 05-	-05-1996 -12-1998 -02-1997 -05-1996
WO 9512684	A	11-05-1995	AU 8095494 A 23- DE 69416166 D 04- EP 0734450 A 02- ES 2126793 T 01-	-02-1999 -05-1995 -03-1999 -10-1996 -04-1999 -10-1995
US 5047335	Α	10-09-1991	NONE	
EP 0475354 .	A	18-03-1992	AU 661824 B 10- AU 8376091 A 19- CA 2051047 A 12- JP 6105692 A 19-	-03-1992 -08-1995 -03-1992 -03-1992 -04-1994 -08-1992
WO 9635718	A	14-11-1996	CA 2220515 A 14- EP 0830376 A 25-	-11-1996 -11-1996 -03-1998 -07-1998
EP 267678	A	18-05-1988	AU 7842987 A 16- DK 478287 A 16- FI 873897 A 16- JP 63185396 A 30-	-09-1990 -03-1989 -03-1988 -03-1988 -07-1988 -10-1987

Int. donales Aktenzeichen PCT/EP 98/07876

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 6 C07K14/505 C12N15/16 C12N5/06 C12N15/85 C12N5/08 C12N5/10 A61K38/18 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 C12N C07K Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie* γ TAKEUCHI M ET AL: "RELATIONSHIP BETWEEN 1-6. SUGAR CHAIN STRUCTURE AND BIOLOGICAL 9-12,ACTIVITY OF RECOMBINANT HUMAN 16-18,ERYTHROPOIETIN PRODUCED IN CHINESE HAMSTER 20,21, **OVARY CELLS'** 23,24, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 26,32, SCIENCES OF USA, 36,40-42 Bd. 86, Oktober 1989, Seiten 7819-7822, XP002053701 in der Anmeldung erwähnt siehe Seiten 7821-7822 und Abbildung 3 X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Priontätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung "I " Veröttentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erkann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberlchts 14. Mai 1999 21/05/1999 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Mateo Rosell, A.M.

In: dionales Aktenzeichen
PCT/EP 98/07876

tegorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
alegone"	EP 0 754 703 A (KIRIN BREWERY)	1-6,	
	22. Januar 1997	9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42	
	siehe Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 3, Zeile 15 siehe Spalte 12, Zeile 35-38 siehe Spalte 7, Zeile 15 - Spalte 8, Zeile 7	30,40 42	
	WO 95 12684 A (AMGEN INC) 11. Mai 1995 siehe Seite 4, Zeile 11 - Seite 5, Zeile 28	1,26-31	
Ą	US 5 047 335 A (PAULSON JAMES ET AL) 10. September 1991	1,7,8, 11,12, 15,16,19	
	siehe Spalte 3, Zeile 30 - Spalte 4, Zeile 43		
A	FUKUDA M N ET AL: "SURVIVAL OF RECOMBINANT ERYTHROPOIETIN IN THE CIRCULATION: THE ROLE OF CARBOHYDRATES" BLOOD, Bd. 73, Nr. 1, Januar 1989, Seiten 84-89, XP000199651 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument und insbesondere Seite 88, linke Spalte und Fig. 6	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40	
A	WATSON E ET AL: "STRUCTURE DETERMINATION OF THE INTACT MAJOR SIALYLATED OLIGOSACCHARIDE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS" GLYCOBIOLOGY, Bd. 4, Nr. 2, 1. Januar 1994, Seiten 227-237, XP000576965 siehe Zusammenfassung, Tabelle IV und discussion	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40	
A	NIMTZ M ET AL: "STRUCTURES OF SIALYLATED OLIGOSACCHARIDES OF HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN RECOMBINANT BHK-21 CELLS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 213, Nr. 1, 1. April 1993, Seiten 39-56, XP000576796 siehe Seiten 45-46, Tabelle 4 und discussion	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40	
	-/		

int ationales Aktenzeichen
PCT/EP 98/07876

0 /5	ALC MECENTUCH ANGECENERIC UNITED AGEN	101/21 38/0/8/0
Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile Betr. Anspruch Nr.
A	HOKKE C H ET AL: "STRUCTURAL ANALYSIS OF THE SIALYLATED N- AND O-LINKED CARBOHYDRATE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS. SIALYLATION PATTERNS AND BRANCH LOCATION OF DIMERIC N-ACETYLLACTOSAMINE UNITS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 228, März 1995, Seiten 981-1008, XP000199646 siehe Figs. aus Seite 1002, discussion und Tabelle 5	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	CHOI D ET AL: "Erythropoietin: physico- and biochemical analysis" JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B: BIOMEDICAL APPLICATIONS, Bd. 687, Nr. 1, 6. Dezember 1996, Seite 189-199 XP004062816 siehe das ganze Dokument und insbesondere Seiten 194-196 und Fig. 4	1
Α	EP 0 475 354 A (BEHRINGWERKE AG) 18. März 1992 siehe Seite 2-3	1,8,11, 12,15,16
A	WO 96 35718 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH;BURG JOSEF (DE); SCHNEIDER WALTER (DE);) 14. November 1996 siehe das ganze Dokument	1,32-34
A	EP 0 267 678 A (INTEGRATED GENETICS, INC.) 18. Mai 1988 siehe das ganze Dokument and insbesondere Seite 5, Zeile 54-58.	1,22, 32-34

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intuionales Aktenzeichen
PCT/EP 98/078**7**6

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Mitglied(er) der Veröffentlichung Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung
EP 0754703	A	22-01-1997	AU US CN WO	3815295 A 5843713 A 1142229 A 9613516 A	23-05-1996 01-12-1998 05-02-1997 09-05-1996
WO 9512684	Α	11-05-1995	AT AU DE EP ES US	175999 T 8095494 A 69416166 D 0734450 A 2126793 T 5459031 A	15-02-1999 23-05-1995 04-03-1999 02-10-1996 01-04-1999 17-10-1995
US 5047335	Α	10-09-1991	KEINE		
EP 0475354	Α .	18-03-1992	DE AU AU CA JP PT	4028800 A 661824 B 8376091 A 2051047 A 6105692 A 98917 A	12-03-1992 10-08-1995 19-03-1992 12-03-1992 19-04-1994 31-08-1992
WO 9635718	Α	14-11-1996	AU CA EP JP	5817496 A 2220515 A 0830376 A 10506924 T	29-11-1996 14-11-1996 25-03-1998 07-07-1998
EP 267678	Α	18-05-1988	US AU DK FI JP PT	4954437 A 7842987 A 478287 A 873897 A 63185396 A 85699 A,B	04-09-1990 16-03-1989 16-03-1988 16-03-1988 30-07-1988 01-10-1987